

УДК 618.1-053.84:615.357

## ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГЕСТИНІВ У ЖІНОК ПІЗНЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

*Кравченко О.В.*

*Буковинський державний медичний університет,  
м. Чернівці, Україна*

Прогестини – естроген – гестагенні синтетичні препарати, які широко використовуються в сучасній гінекології як для корекції менструального циклу, так і з контрацептивною метою.

Оральний шлях вживання даних препаратів завдає високо нестабільний ступінь абсорбції, яка може відрізнятися навіть у 3 рази в різних групах пацієнток. Ось чому можна бачити різний клінічний ефект від однакових доз препарату, частіше всього в пацієнток різного репродуктивного віку.

У жінок пізнього репродуктивного віку (35 – 45 років) погіршується також здатність печінки метаболізувати гестроген – гестрагенні препарати, що призводить до небажаних побічних ефектів від застосованої терапії.

Побічні ефекти, такі як захворювання жовчного міхура, нудота, набряки, тромбози при застосуванні вище означеної терапії у жінок після 35 років зустрічаються у 3-4 рази частіше, ніж у пацієнток 20-25 років. Особливо виражені шкідливі ефекти прогестагенної терапії спостерігаються у жінок після 40 років, які палять.

У зв'язку з особливостями змін метаболізму в пізньому репродуктивному віці часто використовуються кореговані дози препаратів, різні форми введення, що, безумовно, створює нестабільну тривалість ефективності.