


579
Р64

Міністерство охорони здоров'я України
Буковинська державна медична академія

РОЗВИТОК САНІТАРНОЇ МІКРОБІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

наукової конференції,
присвяченої 100-річчю з дня
народження професора
КАЛИНИ Георгія Платоновича
м. Чернівці, 17 травня 2002 року



м. Чернівці
2002

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА КОНТАГІОЗНІСТЬ ДЕРМАТОМІКОЗІВ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Боднарюк Н.Д.

Буковинська державна медична академія, м.Чернівці

Мікологічні ураження шкіри є найбільш частими захворюваннями людини (Ольховська К.Б., 2001). За останній час виникли зміни як в епідеміології, так і в клінічній картині дерматомікозів (Федотов В.П., Святенко Т.В., 2000). За повідомленням В.Г. Коляденко (2001), захворюваність мікозами в Україні різко виросла за останні роки і має тенденцію до ще більшого росту. Розширення патології людини, яка обумовлена опуртуністичними грибами, визначається двома глобальними причинами: 1) збільшення частоти первинних і вторинних імунодефіцитних станів, які визначаються дефектами Т-клітинної ланки імунітету, а також порушенням механізмів неспецифічної резистентності; 2) ятрогенні дії, що призводить до надходження в організм великої кількості грибів (Белянин В.А. и соавт., 2001).

Під нашим спостереженням знаходилося 98 хворих з різними мікотичними ураженнями, які були на обліку та отримували лікування в обласному шкірно – венерологічному диспансері м. Чернівці.

Частота захворюваності серед обстежених хворих на дерматомікози серед чоловіків і жінок находиться в співвідношенні 3:1.

Джерело зараження нами виявлено у 51 хворого (52 %), невиясненого генезу – у 47 хворих (47,9 %). Більшість хворих (29 чоловік) передбачають виникнення грибкових уражень в домашніх умовах, що склало 29,6 %. У місцях загального користування інфікування відбулось у 17 осіб (17,4 %) і останнє місце посідають хворі, які заразились від родичів – 5 осіб (5,1 %).

Отже, поширення грибкової інфекції переважно виникає в домашніх умовах.