

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Департамент роботи з персоналом, освіти та науки

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою
напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”

Код ID							


Прізвище									

Варіант _____

**Збірник тестових завдань для складання
ліцензійного іспиту**

Крок Б

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА



ІНСТРУКЦІЯ

Кожне з пронумерованих запитань або незавершених тверджень у цьому розділі супроводжується відповідями або завершенням твердження. Оберіть ОДНУ відповідь (завершене твердження), яка є НАЙКРАЩОЮ у даному випадку та замалюйте у бланку відповідей коло, яке містить відповідну латинську літеру.

ББК 54.1я73
УДК 61

Автори тестових завдань: Борейко Л.Д., Брижатова Л.І., Буднік О.М., Буткова Л.О., Бялий А.О., Вєсклярова У.П., Вибіцька О.В., Волкова О.А., Волощук В.І., Гайдуков В.А., Голод В.М., Гончарова Н.М., Горошко О.М., Гужва В.Й., Давидова В.Ф., Дяченко Л.А., Єфременко Л.М., Журомський В.С., Зайцева В.П., Калініченко О.В., Калініченко О.І., Кияшко Г.П., Кінах А.А., Клішевич І.Б., Козинець І.А., Компанієць К.М., Компанієць Т.Л., Кондратьєва Ю.А., Кошан М.Ю., Кошелева О.М., Кривущев Б.І., Кулага Н.К., Куліченко Н.О., Кураш П.Д., Лєсик-Лісна О.А., Лихачова М.В., Лук'яненко О.В., Луценко Л.Г., Макарова О.В., Микалюк Л.В., Мороз В.В., Морозюк І.Й., Москаленко Л.М., Нефедова Г.А., Новіцький О.М., Осадча О.Д., Перижняк А.І., Подвалюк В.Ф., Подносова Л.М., Поєдинцева Л.Л., Попова Л.В., Приліпська Н.І., Пурій Г.І., Ратушна С.В., Ржевська О.О., Росток В.О., Сабковська Х.О., Савонік Л.В., Слабодчикова С.Ю., Сояк Т.О., Степанець О.В., Суббочева Т.В., Тараненко О.І., Титаренко Г.Г., Устименко В.А., Уяздовська А.П., Фастовець М.М., Хіміч Т.Ю., Хомко О.Й., Шабаліна Л.І., Шведа Ю.І., Шейко І.А., Шинкарьова С.К., Шихальова З.М., Юхименко І.І., Яременко О.Л. та Комітети фахової експертизи.

Рецензенти. Експерти: Борейко Л.Д., Вовк В.Т., Грицишук П.М., Дуб Н.Є., Журомський В.С., Карпінська Т.Г., Макарова О.В., Макєєва Н.І., Мельничук К.І., Мухіна Т.С., Навчук І.В., Новицька Л.А., Орібко С.Д., Рега Н.І., Хіміч Т.Ю., Шайданюк О.І., Шегедин М.Б., Шульгай О.М.

Збірник містить тестові завдання для проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок Б. Сестринська справа” та подальшого використання у навчальному процесі.

Для викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів, які здійснюють підготовку медичних сестер.

Затверджено Міністерством охорони здоров'я України як екзаменаційне та навчальне видання на підставі висновків експертів.

© Copyright

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ “МЕДИЦИНА” І
“ФАРМАЦІЯ” ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ”.

1. У хворого вібраційна хвороба від локального впливу вібрації I ст., периферичний ангіоспастичний синдром. Який з перелічених медикаментозних засобів доцільно використовувати для лікування?

- A. Судинорозширювальні
- B. Тромболітики
- C. Гормональні препарати (кортикостероїди)
- D. Антибіотики
- E. Заспокійливі

2. Дитині 7 років. Скаржиться на переймоподібний біль у животі, часті випорожнення, блювання, підвищення t° тіла до $38,5^{\circ}C$. Живіт здутий, болючий при пальпації, в лівій здухвинній ділянці. Випорожнення до 10 раз на добу з домішками слизу та крові. Для якого захворювання це характерно?

- A. Дизентерія
- B. Сальмонельоз
- C. Холера
- D. Ешерихіоз
- E. Харчова токсикоінфекція

3. При обстеженні хворого з нефротичним синдромом виявлені зміни в клінічному аналізі сечі. Яка з перерахованих змін в клінічному аналізі сечі найхарактерніша для даного синдрому?

- A. Протеїнурія
- B. Еритроцитурія
- C. Зрушення рН сечі в лужну сторону
- D. Лейкоцитурія
- E. Поява "активних лейкоцитів"

4. До інституту профзахворювань звернувся пацієнт 63-х років, зі скаргами на інтенсивний біль у кистях рук, який віддає до плечового поясу, головний біль, швидко втомлюваність. Понад 10 років працює бурильником в шахті. Об'єктивно: хворий дратівливий, фаланги пальців рук мають вигляд "барабанних паличок", кисті рук набряклі, ціанотичного кольору, розлади больової чутливості за типом "куртки". Яке обстеження доцільно ввести до плану медсестринських втручань, щоб дослідити вібраційну чутливість?

- A. Палестезіометрія
- B. Капіляроскопія
- C. Проба на реактивну гіперемію
- D. Холодова проба
- E. Алгезиметрія

5. Дитині 12-ть місяців, госпіталізована в педіатричне відділення з приводу сухого кашлю підвищення t° тіла до $38,7^{\circ}C$. Об'єктивно: стан дитини важкий, дитина

на млява, виражена блідість слизових оболонок, шкіри, навколо носа і рота - ціаноз. Під час дихання спостерігається втягіння міжреберних проміжків, роздування крил носа. ЧД- 56/хв., ЧСС- 150/хв. Здійснюючи III етап медсестринського процесу, медична сестра запланує обстеження пацієнта:

- A. Рентгенологічне
- B. УЗД
- C. ЕКГ
- D. Біохімічне дослідження крові
- E. Аналіз сечі по Зимницькому

6. Пацієнт 60-ти років з діагнозом "І-ХС: гострий коронарний синдром". Після порушення ліжкового режиму стан пацієнта погіршився. Посилились болі за грудниною, задишка, загальна слабкість АТ- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., в легенях вислуховуються вологі різнокаліберні хрипи, пацієнт вкритий холодним липким потом. Який з препаратів слід застосувати для корекції гемодинаміки?

- A. Дофамін
- B. Корглікон
- C. Ефедрин
- D. Строфантин
- E. Атропін

7. "Сонячний удар" - форма перегрівання, зумовлена впливом сонячних променів на незахищену голову за відсутності загального перегрівання організму. До симптомів "сонячного удару" належать:

- A. Загальна слабкість, запаморочення, блювання, епілептоформні напади
- B. Сухість шкірних покривів, болі в животі, загальна слабкість
- C. Гіперемія шкіри, ослаблення пульсації, запаморочення
- D. Галюцинації, загальна слабкість, запаморочення
- E. Носові кровотечі, блювання

8. Пацієнт 45-ти років знаходиться на лікуванні в психіатричному відділенні. Хворий сидить на ліжку, відмовляється встати, загальмований, відповідає тихим сумним голосом. При розмові хворого з медичною сестрою стверджує, що "марно прожив життя", "нічого доброго не зробив", "немає більше для чого жити". Часто плаче, просить позбавити його життя. Який психічний розлад може виявити медична сестра у хворого?

- A.** Депресивний синдром
- B.** Маніакальний синдром
- C.** Параноїдне маячіння
- D.** Гебефренічне збудження
- E.** Кататонічне збудження

9. Медичну сестру аграрного господарства викликали до пацієнта - працівника складу отрутохімікатів, у якого вона виявила ознаки гострого отруєння ртутьорганічними пестицидами. Який препарат для знешкодження ртуті слід ввести насамперед?

- A.** Унітіол
- B.** Пірацетам
- C.** Преднізолон
- D.** Аскорбінова кислота
- E.** Атропіну сульфат

10. Ви медична сестра відділення інтенсивної терапії. У відділення поступив пацієнт з діагнозом "Свинцева коліка". Який лікарський засіб потрібно ввести в першу чергу при наданні невідкладної допомоги з метою зв'язування свинцю?

- A.** Тетацин кальцію
- B.** Аскорбінова кислота
- C.** Ацетилсаліцилова кислота
- D.** Анальгін
- E.** Ноотропіл

11. У пацієнта непропорційне збільшення носа, губ, підборіддя, кистей рук, ступнів. Скаржиться на головний біль, запаморочення, біль у суглобах. На рентгенограмі черепа виявлено збільшення розмірів "турецького сідла"; витончення його стінок. Вказані ознаки характерні для:

- A.** Акромегалії
- B.** Хвороби Іценка-Кушінга
- C.** Гігантизму
- D.** Пухлини наднирника
- E.** Стовбурового енцефаліту

12. Пацієнт 45-ти років звернувся зі скаргами на слабкість, помірне підвищення температури тіла, набряки на обличчі, зміну кольору та кількості сечі. Хворіє тиждень після перенесеної ангіни. Об'єктивно: шкіра бліда, набряк повік, АТ-170/100 мм рт.ст., Рс- 90/хв., тони серця приглушені, симптом Пастернацького - позитивний. Яке дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

- A.** Аналіз сечі за Нечипоренком
- B.** Аналіз сечі на глюкозу
- C.** Аналіз сечі за Зимницьким
- D.** Загальний аналіз крові
- E.** Аналіз сечі на діастазу

13. Хвора 24-х років скаржиться на біль у суглобах нижніх кінцівок, який посилюється при незначних рухах, неприємні відчуття і біль у ділянці серця, задишку, загальну слабкість, підвищення температури тіла до $37,8^{\circ}\text{C}$. Захворіла через 2 тижні після перенесеної ангіни. Об'єктивно: тони серця приглушені, м'який систолічний шум на верхівці серця. Правий колінний суглоб припухлий, шкіра над ним червона, гаряча на дотик. У крові: лейк.- $9,9 \cdot 10^9/\text{л}$, ШОЕ- 28 мм/год., НЬ- 105 г/л. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Ревматична хвороба
- B.** Стенокардія
- C.** Ревматоїдний артрит
- D.** Кардіосклероз
- E.** Інфекційно-алергічний міокардит

14. Хвора скаржиться на різкий біль у правому підребер'ї, який іррадіює у праве плече, лопатку, нудоту, блювання. Хворіє понад 5-ть років. Під час огляду: хвора збуджена, шкіра волога, язик обкладений білим нальотом. Живіт здутий, болючий в правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Кера. Який діагноз у хворої?

- A.** Загострення хронічного холецистити
- B.** Виразкова хвороба
- C.** Гострий гастрит
- D.** Загострення панкреатиту
- E.** Синдром подразненого кишечника

15. Хворий скаржиться на нудоту, блювання, біль оперізуючого характеру, слабкість. Такий стан розвинувся після вживання алкоголю та гострої, жирної їжі. Об'єктивно: шкіра бліда, язик обкладений сірим нальотом, живіт болючий більше в епігастрії та лівому підребер'ї. Яке дослідження найбільш інформативне для встановлення діагнозу?

- A.** Аналіз сечі та крові на діастазу
- B.** Загальний аналіз сечі
- C.** Аналіз крові на глюкозу
- D.** Копрограма
- E.** Аналіз калу на приховану кров

16. У дитини 7-ми років після споживання чіпсів з'явилися нудота, блювота, біль у животі. Ацетон сечі (++) . Про який стан можна думати ?

- A.** Ацетонемічний синдром
- B.** Хронічний розлад живлення
- C.** Гастрит
- D.** Дуоденіт
- E.** Виразкова хвороба шлунку

17. Ви - медсестра дитячого інфекційно-

го відділення. Які характерні гематологічні зміни спостерігаються у разі кашлюку?

- A.** Лімфоцитоз
- B.** Анемія
- C.** Нейтрофіліоз
- D.** Еозинофілія
- E.** Тромбоцитопенія

18. При розробці та впровадженні товару чи медичної послуги використовують поняття життєвого циклу товару. Назвіть його правильну послідовність:

- A.** Впровадження, зростання, зрілість, насичення, спад
- B.** Впровадження, зрілість, зростання, насичення, спад
- C.** Впровадження, спад, зрілість, зростання, насичення
- D.** Впровадження, зростання, насичення, зрілість, спад
- E.** Зростання, впровадження, зрілість, насичення, спад

19. У відділення надійшов пацієнт зі скаргами на нападоподібні інтенсивні болі у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та руку, нудоту, блювання. Напад пов'язує з вживанням жирної їжі. При огляді: іктеричність склер. Яке обстеження необхідно провести в першу чергу?

- A.** УЗД органів черевної порожнини
- B.** Загальний аналіз крові
- C.** Загальний аналіз сечі
- D.** Кров на діастазу
- E.** Кров на визначення рівня холестерину

20. Під час проведення проби на біологічну сумісність крові у пацієнта 29-ти років з'явилися стурбованість, утруднене дихання, свербіння шкіри. При огляді виявлені великоплямиста висипка, набряк обличчя. Який стан розвинувся?

- A.** Анафілактична реакція
- B.** Септичний шок
- C.** Пірогенна реакція
- D.** Гемолітична реакція
- E.** Цитратний шок

21. Медсестрою-бакалавром приймального покою проведено опитування пацієнта 72-х років. Після цього вона поговорила з родичами пацієнта, які супроводжували його, і дізналась, що пацієнт перебільшує симптоми свого захворювання. Як називається така поведінка пацієнта?

- A.** Агравація
- B.** Симуляція
- C.** Дисимуляція
- D.** Апеляція
- E.** Атаксія

22. Машиною швидкої допомоги в клініку доставлено пацієнта з попереднім діагнозом: виразкова хвороба шлунка, перфорація виразки. Який характер болю у пацієнта при цій патології?

- A.** "Кинджальний"
- B.** Тиснучий
- C.** Пекучий
- D.** Колька
- E.** Оперізуючий

23. У пацієнта відмічаються болі в епігастральній ділянці, періодичні, сезонні, тісно пов'язані з прийомом їжі (через 15-45 хвилин після приймання їжі), зменшуються після блювання та застосування тепла. Для якого захворювання характерна дана картина?

- A.** Виразкова хвороба шлунка
- B.** Жовчнокам'яна хвороба
- C.** Гастрит
- D.** Езофагіт
- E.** Дискінезія жовчовивідних шляхів

24. Після проведеного обстеження у пацієнтки 39-ти років виявлено скарги на різкий біль в поперековій ділянці, незначне підвищення температури. Встановлено попередній діагноз: сечокам'яна хвороба. Яке з досліджень має найбільше значення для діагностики даного захворювання?

- A.** Загальний аналіз сечі
- B.** Проба за Зимницьким
- C.** Дослідження сечі за методом Нечипоренка
- D.** Визначення креатиніну
- E.** Визначення протеїнуриї

25. Під час обстеження пацієнта бригадою швидкої допомоги виявлено: він сидить, не змінюючи пози (зі слів родичів багато годин), на запитання відповідає повільно, після паузи окремими словами; самостійно не їсть. Який ступінь пригнічення психічної активності?

- A.** Ступор
- B.** Сопор
- C.** Кома
- D.** Обнубіляція
- E.** Сомнолентність

26. Старша медична сестра відділення читає лекцію з теми "Ринок медичних послуг". Які функції притаманні ринку

охорони здоров'я?

- A.** Інформаційна, ціноутворювальна, регулююча, посередницька
- B.** Ціноутворювальна, інтеграційна, посередницька, управлінська
- C.** Інформаційна, коригувальна, посередницька, контролююча
- D.** Контролююча, інформаційна, регулююча, благодійницька
- E.** Ціноутворювальна, коригувальна, регулююча, посередницька

27. Ви - старша медична сестра відділення. До Вас з проханням звернулася медична сестра пояснити, з яких елементів складається заробітна плата. Поясніть:

- A.** Тарифна система та нормування праці
- B.** Посадовий оклад, тарифна ставка
- C.** Тарифний коефіцієнт, тарифний розряд
- D.** Тарифна ставка, тарифний коефіцієнт
- E.** Посадовий оклад, тарифна ставка

28. Ви - головна медична сестра районної лікарні. Ви проводите лекцію на тему: "Маркетинг у системі охорони здоров'я". Які основні функції виконує маркетинг?

- A.** Аналітична, виробнича, збутова, управлінська
- B.** Наукова, аналітична, управлінська, коригувальна
- C.** Управлінська, наукова, виробнича, збутова
- D.** Аналітична, коригувальна, управлінська, збутова
- E.** Виробнича, управлінська, аналітична, наукова

29. Ви - головна медична сестра. Готуєте доповідь "Групи інвалідності". Для II групи інвалідності характерно:

- A.** Наявність функціональних порушень, але ця особа не потребує сторонньої допомоги
- B.** Наявність вроджених фізичних вад, потребує стороннього догляду
- C.** Постійна втрата працездатності, потребує стороннього догляду
- D.** Наявність ознак ГРВІ чи грипу
- E.** Захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД та венеричні хвороби

30. Через 10-ть днів після перенесеної ангіни дівчина 19-ти років звернулася до дільничного лікаря у зв'язку з наявністю набряків на обличчі, різкої слабкості. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, t° - $37,4^{\circ}C$, ЧСС - 98/хв., АТ - 165/98 мм рт.ст. Серцеві тони приглушені, акцент II тону над аортою. Сеча темно-червоного кольору, 400 мл на добу. В яке відділення

слід госпіталізувати хвору?

- A.** Нефрологічне
- B.** Терапевтичне
- C.** Урологічне
- D.** Кардіологічне
- E.** Інфекційне

31. Під час післяопераційного періоду у хворого почалося різке падіння артеріального тиску та пригнічення дихальної діяльності. Який препарат необхідно ввести хворому?

- A.** Кордіамін
- B.** Еуфілін
- C.** Мезатон
- D.** Фенобарбітал
- E.** Адреналін

32. Наукове дослідження проводиться в певній послідовності, починаючи з аналізу стану об'єкта дослідження та закінчуючи формуванням висновків і оцінкою впровадження результатів досліджень в практику. Випробування впроваджених результатів проводиться на основі:

- A.** Результатів практичної виробничої перевірки дослідних зразків
- B.** Регламенту
- C.** Розпорядження Міністерства охорони здоров'я
- D.** Нової теми досліджень
- E.** Комплексу договірної документації між замовником і підрядником

33. У водолаза, що працює на глибині біля 10 м, більше ніж 20 хвилин виникли загальна слабкість, біль у вухах, суглобах і м'язах, сонливість, дихання поверхневе, часте, втрата свідомості. Яка хвороба виникла у водолаза?

- A.** Кесонна хвороба
- B.** Висотна хвороба
- C.** ІХС
- D.** Гіпертензивний криз
- E.** Нейроциркуляторна дистонія

34. Дитина 10-ти місяців неспокійна, перелякана. Шкіра бліда, ціанотичні кінцівки, дихання шумне, часте, з утрудненим вдихом. Кашель гавкаючий, нападоподібний, голос втратив гучність. Яке захворювання у дитини?

- A.** Гострий стенозуючий ларингіт
- B.** Гостра пневмонія
- C.** Приступ бронхіальної астми
- D.** Гострий бронхіт
- E.** Гострий фарингіт

35. У перші місяці життя малюк, наро-

джений ВІЛ-інфікованою матір'ю, буде мати позитивний аналіз крові на ВІЛ. До якого терміну життя встановлюється статус ВІЛ-інфікованості?

- A.** До 18 місяців
- B.** До 12 місяців
- C.** До 6 місяців
- D.** До 3 місяців
- E.** До 24 місяців

36. При проведенні оцінки конкурентоспроможності медичних послуг медичний заклад враховував:

- A.** Вартість медичних послуг
- B.** Співвідношення збуту й цін
- C.** Загальні та відносні витрати
- D.** Імовірні стратегії конкурентів
- E.** Показники повторних купівель

37. При постачанні товарів аптечного асортименту основним юридичним документом, який визначає права і обов'язки, як фармацевтичної фірми так і лікувальної установи, є:

- A.** Договір (контракт)
- B.** Сертифікат якості
- C.** Акти на списання
- D.** Протокол розбіжностей
- E.** Специфікація

38. Медична сестра по дорозі на роботу впала. Наприкінці робочого дня їй стало погано і за порадою лікарів вона прийняла відповідні ліки. Вночі стан її погіршився і була викликана швидка допомога. Другий день вона працювала. На третій день після падіння на дім був викликаний сімейний лікар. З якого дня вона отримає лікарняний?

- A.** На 3-й день після падіння, в день виклику сімейного лікаря
- B.** В день падіння
- C.** З моменту виклику швидкої допомоги
- D.** В перші три дні вона отримує довідку, а потім лікарняний листок
- E.** В перший день, коли звернулась до лікарів на роботі

39. З метою раннього виявлення захворювання на туберкульоз усім студентам та працівникам медичного коледжу було проведено флюорографічне обстеження. Який метод вивчення захворюваності був використаний?

- A.** Спеціальне вибіркове дослідження
- B.** Медичний огляд окремих груп
- C.** Профілактичний
- D.** Загальний
- E.** Поточний

40. Після автомобільної катастрофи хворий 1 місяць у стаціонарі та 2 місяці амбулаторно лікувався. Через 1,5 місяця стан його погіршився і в тяжкому стані він поступив в стаціонар, де лікувався 2 місяці. Яка подальша тактика ведення пацієнта?

- A.** Переведення на загальну інвалідність
- B.** Продовжити лікування в амбулаторних умовах
- C.** Переведення на інвалідність по трудовому каліцтву
- D.** Вихід на роботу
- E.** Організація стаціонара на дому

41. Пацієнту 3 роки. Відвідує ДДЗ. Скарги на кашель, нежить, світлобоязнь, слинотечу, підвищення температури тіла до 38°C , кволість. Хворіє третю добу. Об'єктивно: на слизовій щік проти малих кутніх зубів дрібні плями розміром з макове зерно, оточені червоним вінчиком. Дитині був встановлений діагноз: "Кір". Визначте, в якому періоді хвороби перебуває дитина на підставі перерахованих проблем?

- A.** Катаральний період
- B.** Інкубаційний період
- C.** Період висипу
- D.** Період пігментації
- E.** Період видужування

42. Новонароджена дівчинка народилася від других пологів при терміні гестації 22 тижні, з масою тіла 1000 г, довжиною тіла - 40 см. Згідно листка лікарських призначень з метою профілактики рахіту планується введення наступного препарату:

- A.** Відехол
- B.** Супрастин
- C.** Феррокаль
- D.** Афлубін
- E.** Софрадекс

43. Ви працюєте в медико-санітарній частині. Одним з найважливіших розділів роботи є організація та проведення профілактичних медичних оглядів з розробкою подальших оздоровчих заходів. Протягом року на обстеження викликали по 5-15 чоловік на день. Яка це форма проведення періодичних медичних оглядів?

- A.** Поточна
- B.** Попередня
- C.** Облікова
- D.** Одномоментна
- E.** Цільова

44. Ви досліджували захворюваність ме-

дичних сестер на гострі респіраторні вірусні інфекції. З висновками необхідно ознайомити медичний персонал відділення. Що необхідно написати?

- A.** Резюме
- B.** Тези
- C.** Анотація
- D.** Конспект
- E.** Виписки

45. У хворої на дифузно-токсичний зоб збільшена щитоподібна залоза не лише пальпується, а й помітна при ковтанні. Вкажіть ступінь збільшення щитоподібної залози:

- A.** II ступінь
- B.** III ступінь
- C.** I ступінь
- D.** V ступінь
- E.** IV ступінь

46. У новонародженої доношеної дитини виражена інтоксикація, на шкірі з'явилися великі пухирі (2-3 см у діаметрі), які швидко збільшуються. Пухирі з каламутним вмістом, деякі лопаються, залишаючи ерозивну поверхню. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A.** Пухирчатка новонароджених
- B.** Везикулопустульоз
- C.** Псевдофурункульоз
- D.** Фурункульоз
- E.** Герпес-інфекція

47. В дитячий стаціонар поступила дитина 1 рік 2 міс., з генералізованими судомами та ознаками рахіту. Після надання допомоги було проведено дослідження на вміст кальцію у крові. Показник кальцію - 1,7 ммоль/л. Додаткове обстеження вказує на діагноз:

- A.** Спазмофілія. Судоми
- B.** Спазмофілія, ларингоспазм
- C.** Рахіт, гострий період. Судоми
- D.** Гіпервітаміноз D. Судоми
- E.** Рахіт залишкових явищ

48. У дитини 10-ти місяців з масою тіла 8 кг, декілька разів повторювався карпопедальний спазм, раптово відбувся напад загальних судом. Необхідно ввести протисудомний препарат у дозі:

- A.** 0,5% сибазон 0,8 мл
- B.** 0,5% сибазон 0,5 мл
- C.** 0,5% седуксен 0,5 мл
- D.** 0,5% діазепам 2 мл
- E.** 0,5% діазепам 0,2 мл

49. Оральна регідратація проводиться дитині з кишковим токсикозом та водо-

дефіцитним ексикозом. Рідину у вигляді 5% розчину глюкози, регідрону, ораліту дають дитині пити:

- A.** По 10 мл кожні 10-15 хвилин
- B.** По 20 мл кожну годину
- C.** По 10 мл через 30 хвилин
- D.** По 50 мл кожну годину
- E.** По 50 мл через 2 години

50. Дівчинка 6-ти років скаржиться на підвищення температури тіла, головний біль та біль у животі. На нижніх кінцівках над поверхнею м'язів-розгиначів симетрично з'явилися елементи геморагічного висипу. У дитини стан тяжкий, що передбачає введення антикоагулянтів прямої дії, а саме:

- A.** Гепарин
- B.** Контрикал
- C.** Дипіридамол
- D.** Аскорутин
- E.** Вольтарен

51. Новонародженій дитині, яка перебуває у відділенні патології новонароджених з діагнозом вродженої пневмонії, внутрішньовенно 2 рази на добу вводиться антибіотик пеніцилінового ряду, захищений клавулановою кислотою, а саме:

- A.** Амоксиклав
- B.** Амоксицилін
- C.** Ампіцилін
- D.** Ампіокс
- E.** Амікацин

52. Виконуючи медсестринське обстеження пацієнта, медична сестра повинна пам'ятати, що загальний огляд хворого починають з визначення:

- A.** Загального стану
- B.** Свідомості
- C.** Положення в ліжку
- D.** Конституції
- E.** Кольору шкіри

53. Пацієнта турбує біль, який супроводжується шумом тертя перикарда, виникає одночасно з підвищенням температури тіла, без іррадіації і зменшується при положенні тіла з нахилом вперед. Такий біль характерний для:

- A.** Гострого сухого перикардиту
- B.** Тромбоемболії легеневої артерії
- C.** Кардіосклерозу
- D.** Спонтанного пневмотораксу
- E.** Міозиту

54. У хворого порушення серцевого ритму, при якому протягом усього серцево-

го циклу визначають хаотичне збудження та скорочення м'язових волокон пердсердь. Для якого стану це характерно?

- A.** Миготлива аритмія
- B.** Пароксизмальна тахікардія
- C.** Синусова тахікардія
- D.** Синусова аритмія
- E.** Атріовентрикулярна блокада

55. До медичної сестри приймального відділення звернувся пацієнт, який протягом 5-ти років страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки. 6 годин тому виникли гострий біль у животі, нудота, різка слабкість. Об'єктивно: блідий, АТ-100/60 мм рт.ст., Рс- 96/хв. Язик сухий, живіт дошкоподібний. Симптоми подразнення очеревини на всьому протязі позитивні. Назвіть допоміжний метод обстеження органів черевної порожнини, який необхідно провести для діагностики захворювання:

- A.** Оглядова рентгенографія
- B.** УЗД
- C.** Іригоскопія
- D.** Лапароцентез
- E.** Колоноскопія

56. Ви обстежуєте пацієнта 42-х років, якого доставлено до травматологічного відділення після ДТП. Пацієнт загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. Частота дихання - 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле. У верхній третині стегна відчувається кrepітація та патологічна рухливість. Рс- 112/хв., АТ-80/45 мм рт.ст. Стан пацієнта відповідає:

- A.** Шок II ступеня
- B.** Шок I ступеня
- C.** Шок IV ступеня
- D.** Шок III ступеня
- E.** Передагонія

57. Сімейна медсестра викликана до 4-річного хлопчика, який при купанні протягом 4-х хвилин знаходився під водою. Відсутній пульс на сонній артерії та дихання, виражений ціаноз шкірних покривів. З чого слід почати дії?

- A.** Видалити воду з верхніх дихальних шляхів
- B.** Викликати швидку допомогу
- C.** Провести масаж серця
- D.** Дати вдихнути нашатирний спирт
- E.** Заспокоїти матір

58. В амбулаторію сімейного лікаря звернулася жінка зі скаргами на біль у животі, нудоту, блювання. При обстеженні позитивний симптом Воскресен-

ського, Ровзінга, Щоткіна. Яку патологію слід запідозрити?

- A.** Гострий апендицит
- B.** Гострий панкреатит
- C.** Гострий холецистит
- D.** Жовчнокам'яна хвороба
- E.** Хронічний панкреатит

59. Хворий 65-ти років, який страждає протягом 10-ти років на хронічний ларингіт, скаржиться на зміну голосу, охриплість, біль. За останні два місяці схуд на 10 кг. Це патологія характерна для такого стану пацієнта:

- A.** Рак гортані
- B.** Рак стравоходу
- C.** Рак щитоподібної залози
- D.** Зоб ендемічний
- E.** Рак шлунка

60. У пацієнта 45-ти років побутова рана на лівій гомілці, отримана 2 дні тому. В ділянці рани виявляється набряк, почервоніння, підвищення температури тканини, посилення болю, порушення функції пошкодженої кінцівки. Рана знаходиться за класифікацією М.І. Кузіна і Б.М. Костюченко в фазі:

- A.** Фаза запалення, період судинних змін
- B.** Фаза запалення, період очищення рани
- C.** Фаза регенерації і формування грануляцій
- D.** Фаза дегідратації
- E.** Фаза запалення, період нагноєння рани

61. Пацієнтка 40-ка років скаржиться на біль, який виник після фізичного навантаження. Біль іррадіює у пахвинну ділянку. Хвора збуджена, не знаходить собі місця від болю, кричить. Біль супроводжується нудотою, блюванням, затримкою газів та випорожнень. При обстеженні пацієнтки відмічається болючість у ділянці лівої нирки, позитивний симптом Пастернацького. Перша невідкладна допомога в даному випадку складається з:

- A.** Призначення спазмолітиків, гарячої ванни
- B.** Літотрипсія, грілка на попереk
- C.** Призначення прийому рідини, гарячої ванни
- D.** Призначення антибіотиків та спазмолітиків
- E.** Заспокоїти хвору, холод на попереk

62. Ви - медична сестра дитячого пульмонологічного відділення. На лікуванні знаходиться дитина 10-ти років з бронхіальною астмою. Приступів ядухи не спостерігається. Здійснюючи медсестринський процес в період між приступами

ядухи необхідно проводити терапію протизапальними та протиалергійними препаратами. Виберіть необхідний препарат:

- A.** Інтал
- B.** Серетид
- C.** Сальбутамол
- D.** Димедрол
- E.** Беротек

63. Дитині 7 років. Скарги на біль під час ковтання, високу температуру тіла. Загальний стан порушений. У зіві - на почервонілій слизовій оболонці інфільтрованих мигдаликів у ділянці лакун жовтобілого кольору обмежені нашарування. Перераховані симптоми вказують на:

- A.** Лакунарна ангіна
- B.** Фолікулярна ангіна
- C.** Катаральна ангіна
- D.** Гостра респіраторна вірусна інфекція
- E.** Дифтерія зівя

64. Впродовж двох тижнів дитину 3-х років турбував сухий кашель, незначні виділення з носа. Стан дитини погіршився, кашель набув спазматичного характеру. Напади кашлю закінчуються блюванням. Запідозрено кашлюк. Критеріями легкої форми захворювання є:

- A.** Частота нападів кашлю - до 15 на добу, репризів до 5
- B.** Частота нападів кашлю - до 25 на добу, репризів до 10
- C.** Частота нападів кашлю - більше 25 на добу, репризів більше 10
- D.** Напади закінчуються блюванням, крововиливом в слизові, носові кровотечі
- E.** Частота нападів кашлю - 1-2 на добу, репризів немає

65. Диспансерні контингенти населення підлягають періодичним профілактичним оглядам, програми яких передбачають такі дослідження: аналіз крові, аналіз сечі на глюкозу, аналіз сечі на білок, флюорографію. Назвіть віковий термін проведення даної програми?

- A.** З 12 років 1 раз на 2 роки
- B.** З 7 років 1 раз на 2 роки
- C.** З 12 років 1 раз на 1 рік
- D.** З 14 років 1 раз на 2 роки
- E.** З 14 років 2 рази на 1 рік

66. Документ, який засвідчує право на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного періоду за умови виконання вказаних умов - це:

- A.** Ліцензія
- B.** Сертифікат
- C.** Патент
- D.** Дозвіл
- E.** Довідка

67. На який максимальний термін при безперервному захворюванні надається лікарняний лист хворому, що лікується в медичному закладі до визначення йому інвалідності?

- A.** 4 місяці
- B.** 1 місяць
- C.** 2 місяці
- D.** 3 місяці
- E.** 5 місяців

68. Дівчинка народилася з масою тіла 3400 г, довжиною тіла 52 см. Вагітність і пологи фізіологічні. В перший і другий день сечовипускання було 5-6 разів на добу. На 3-й день після сечопуску на пелюшці помітна жовто-червона пляма, місцями червоно-жовті кристалики. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Сечокислий інфаркт нирок
- B.** Статевий криз
- C.** Пієлонефрит
- D.** Гломерулонефрит
- E.** Вульвовагініт

69. Хлопчик 9-ти років добу тому впав та вдарив праву нижню кінцівку. Об'єктивно: температура тіла - 38°C . Відмічаються загальмованість, млявість. У верхній третині правої гомілки розлитий набряк, болісний при пальпації. Рухи у правому колінному суглобі різко обмежені через біль. З анамнезу: тиждень тому переніс фолікулярну ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Гострий гематогенний остеомиєліт
- B.** Флегмона правої гомілки
- C.** Вивих правого колінного суглоба
- D.** Перелом правого колінного суглоба
- E.** Гострий артрит колінного суглоба

70. До хірургічного кабінету поліклініки звернувся пацієнт 39-ти років зі скаргами на загальну слабкість, порушення сну, підвищення температури тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$. На задній поверхні шиї в ділянці потилиці - інфільтрат червоного кольору, в центрі якого кілька гнійних стрижнів. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Карбункул
- B.** Фурункул
- C.** Флегмона
- D.** Абсцес
- E.** Лімфангіт

71. В хірургічному відділенні знаходиться хворий 36-ти років у важкому стані. Скарги на загальну слабкість, безсоння, насадний кашель. Об'єктивно температура тіла - $39,7^{\circ}\text{C}$, тахіпное. На 9 добу у хворого на фоні частого кашлю виділилось близько 600 мл гнійного харкотиння. Стан пацієнта дещо покращився. Про яке захворювання йдеться?

- A.** Абсцес легень
- B.** Пневмонія
- C.** Плеврит
- D.** Емпієма плеври
- E.** Туберкульоз легень

72. Після закінчення медичного коледжу Ви влаштувались на роботу в хірургічне відділення на посаду операційної медсестри. Вкажіть антисептичний розчин для передопераційної обробки рук за методом Спасокукоцького-Кочергіна:

- A.** 0,5% розчин аміаку
- B.** 3% розчин перекису водню
- C.** 85% розчин мурашиної кислоти
- D.** 1% розчин хлоргексидину біглюконату
- E.** 5% розчин діоциду

73. Пацієнтка 48-ми років прооперована з приводу перфоративної виразки шлунка. З метою профілактики кровотечі на ділянку післяопераційної рани медична сестра поклала міхур з льодом. Вкажіть максимальний час, протягом якого можна тримати накладений міхур із льодом не знімаючи:

- A.** 2-3 години
- B.** 1-2 години
- C.** 3-4 години
- D.** 4-5 годин
- E.** 5-6 годин

74. На місце маніпуляційної медичної сестри опікового відділення прийнято нову співробітницю. Старша медична сестра зазначеного відділення ознайомила нову працівницю з коротким письмовим викладом її основних прав та обов'язків на робочому місці. Визначте вид даного документу:

- A.** Посадова інструкція
- B.** Розпорядження
- C.** Наказ
- D.** Пояснювальна записка
- E.** Доповідна записка

75. Причинами смертності населення є: 1) хвороби системи кровообігу, 2) травми та отруєння, 3) новоутворення, 4) СНІД, 5) хвороби органів дихання. Яка

з перерахованих причин займає перше рангове місце в структурі причин смерті населення розвинених країн?

- A.** 1
- B.** 2
- C.** 3
- D.** 4
- E.** 5

76. За результатами акредитації обласній клінічній лікарні присвоєно вищу категорію. Який відсоток від максимально можливої кількості балів могла набрати лікарня?

- A.** 92-100
- B.** 81-91
- C.** 75-80
- D.** 74-70
- E.** 69-50

77. На сільській лікарській дільниці проводяться флюорографічні обстеження населення. До якого виду медичного огляду належать ці обстеження?

- A.** Цільовий
- B.** Попередній
- C.** Періодичний
- D.** Комплексний
- E.** Миттєвий

78. У клініку доставлено пацієнта з гострим панкреатитом, зі скаргами на оперізуючий біль у верхній половині живота. Яке дослідження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу?

- A.** Визначення амілази крові
- B.** Зняття ЕКГ
- C.** Загальний аналіз крові
- D.** Оглядовий знімок грудної клітки
- E.** Оглядовий знімок черевної порожнини

79. Ви - медсестра кардіологічного відділення. Скільки разів на день слід проводити провітрювання палат?

- A.** Не менше 4 разів
- B.** Не менше 1 разу
- C.** Не менше 2 разів
- D.** Не менше 3 разів
- E.** Не менше 1-2 разів

80. Ви - медична сестра відділення реанімації. Як часто слід змінювати халати, шапочки і маски?

- A.** Щоденно
- B.** 2 рази на день
- C.** Щотижня
- D.** 2 рази на тиждень
- E.** 2 рази на місяць

81. Ви - старша медична сестра при-

ймального відділення. Як часто обстежується медичний персонал відділення на носійство патогенного стафілокока?

- A. 1 раз в квартал
- B. 1 раз в тиждень
- C. 1 раз в місяць
- D. 2 рази в квартал
- E. 1 раз на рік

82. Ви - старша медична сестра пологового будинку. Згідно якого Наказу здійснюється профілактика ВІЛ в акушерських стаціонарах?

- A. 234
- B. 620
- C. 503
- D. 408
- E. 167

83. При обстеженні пацієнта на хронічний гепатит виявлено ендокринні порушення - гінекомастія, атрофія яєчок, випадіння волосся в пахвових ямках, на лобку. Для якого синдрому це характерно?

- A. Печінково-клітинної недостатності
- B. Біліарної дискінезії
- C. Імунного запалення
- D. Демпінг-синдрому
- E. Астеновегетативного

84. Реєстрація народження дітей проводиться згідно місця проживання батьків, або одного із них. Який основний документ повинен бути наданий до РАЦСу для реєстрації народження дитини?

- A. Медичне свідоцтво про народження дитини
- B. Довідка пологового будинку про народження дитини
- C. Журнал запису пологів в стаціонарі
- D. Свідоцтво про народження дитини
- E. Карта розвитку новонародженого

85. У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. За допомогою якого показника можна охарактеризувати дану ситуацію?

- A. Перинатальна смертність
- B. Загальна смертність
- C. Народжуваність
- D. Смертність при народженні
- E. Шлюбна плідність

86. Для аналізу діяльності стаціонару головний лікар запросив статистичні дані про частоту госпіталізованої захворюваності населення району. На основі якого

статистичного документу розраховані ці дані?

- A. Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару
- B. Листок руху хворих по стаціонару
- C. Історія хвороби
- D. Щоденник роботи лікаря
- E. Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу

87. З приводу гострого трахеїту хворий звертався у поліклініку 10.03. і 14.05. Який документ при цьому належить заповнити?

- A. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"
- B. Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"
- C. Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+" та один талон з позначкою "-"
- D. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-"
- E. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-"

88. У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який документ слід заповнити для обліку даного захворювання?

- A. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання
- B. Медична карта амбулаторного хворого
- C. Контрольна карта диспансерного спостереження
- D. Талон амбулаторного пацієнта
- E. Медична карта стаціонарного хворого

89. Ви працюєте в центрі медичної статистики. За формулою: кількість усіх зареєстрованих протягом даного року захворювань (гострі + всі хронічні, виявлені як у поточному, так і в попередніх роках) x 1000/середньорічна чисельність населення - визначається:

- A. Поширеність захворювань
- B. Первинна захворюваність
- C. Госпітальна захворюваність
- D. Інфекційна захворюваність
- E. Захворюваність з тимчасовою втраченою працездатності

90. До якого рівня належить медична допомога, що передбачає консультацію лікаря загальної практики, діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань, направлення пацієнта для надання спеціалізованої допомоги,

проведення профілактичних заходів?

- A.** Первинний рівень надання медичної допомоги
- B.** Вторинний рівень надання медичної допомоги
- C.** Третинний рівень надання медичної допомоги
- D.** Четвертинний рівень надання медичної допомоги
- E.** -

91. Ви - медична сестра амбулаторії загальної практики сімейної медицини. До Вас звернулися за довідкою про тимчасову непрацездатність. В яких випадках і кому видається довідка встановленої форми?

- A.** Учням всіх категорій, студентам вузів і технікумів
- B.** В зв'язку з вагітністю та пологами
- C.** В зв'язку з протезуванням в умовах стаціонару протезно-ортопедичного підприємства
- D.** При направленні на санаторно-курортне лікування
- E.** В зв'язку з захворюванням працівника

92. У чоловіка виявлено задишку з утрудненим видихом. Шкіра обличчя, губи ціанотичного кольору. Вдих глибокий, видих тривалий. Грудна клітка діжкоподібна, перкуторно - коробковий звук над легенями. Аускультативно - ослаблене везикулярне дихання. Яке захворювання можна запідозрити?

- A.** Емфізема легенів
- B.** Пневмосклероз
- C.** Бронхіт
- D.** Туберкульоз
- E.** Рак легенів

93. При обробці поля в шлунок тракториста потрапили фосфорорганічні сполуки. Які речовини необхідно використати медичній сестрі при наданні першої допомоги постраждалому під час промивання шлунку для інактивації отрути в шлунку?

- A.** 2% розчин двовуглекислої соди, активоване вугілля
- B.** Переварена вода
- C.** Розчин фурациліну
- D.** Рослинна олія
- E.** Молоко

94. Для покращення надання медичної допомоги дітям у загальноосвітніх школах передбачена посада медичної сестри. Яка кількість учнів школи припадає на одну посаду медсестри?

- A.** 700 учнів
- B.** 500 учнів
- C.** 600 учнів
- D.** 800 учнів
- E.** 900 учнів

95. Старша медична сестра провела інструктаж з медсестрами про терміни придатності лікарських засобів з обмеженим строком. Такі засоби можуть зберігатися:

- A.** До 3-х років
- B.** Понад 3-х років
- C.** До 1 року
- D.** До 3-х місяців
- E.** До 1 місяця

96. Хворий лікується в умовах домашнього стаціонару з приводу позагоспітальної пневмонії. На 7-му добу стан погіршився: з'явився біль у грудній клітці, який посилюється при сухому кашлі та русі. Яке найбільш ймовірне ускладнення?

- A.** Плеврит
- B.** Туберкульоз легенів
- C.** Гострий бронхіт
- D.** Абсцес легенів
- E.** Бронхоектатична хвороба

97. Рідкі лікарські засоби на своїй тарі мають етикетки. Як називається різновид етикеток, які мають особливу форму і наклеюються на шийку пляшки з різними рідинами?

- A.** Кольєретки
- B.** Бірки
- C.** Вкладиші
- D.** Контрольні стрічки
- E.** Ярлики

98. Ткаля із тривалим стажем роботи скаржиться на кашель, задишку, періодичні болі в грудній клітині. Назвіть професійне захворювання, яке виникає при тривалому вдиханні пилу бавовни:

- A.** Бісиноз
- B.** Сидероз
- C.** Антракоз
- D.** Азбестоз
- E.** Силікоз

99. До загальних медичних протипоказань для допуску на роботу, пов'язану з небезпечними шкідливими речовинами і шкідливими виробничими факторами (виробництво ароматичних вуглеводнів), відноситься:

- A.** Цироз печінки
- B.** Гіпертонічна хвороба I стадії
- C.** Хронічний гастрит
- D.** Нирковокам'яна хвороба
- E.** Хронічний панкреатит

100. Медична сестра-бакалавр аналізує план лікування для хворого з забоем головного мозку. За призначенням лікаря вона повинна приготувати 40% розчин глюкози, 25% розчин сульфату магнію, діуретичні засоби. З якою метою призначаються ці лікарські засоби?

- A.** Дегідратація мозку
- B.** Підвищення імунітету
- C.** Поповнення ОЦК
- D.** Дезінтоксикація організму
- E.** Зупинка кровотечі

101. У хлопчика 2-х років захворювання почалося з незначних катаральних явищ з боку верхніх дихальних шляхів, підвищення температури тіла до $37,8^{\circ}\text{C}$. На 10-й день хвороби кашель набув нападopodobного характеру, іноді супроводжується блюванням. Температура тіла - нормальна. У загальному аналізі крові відмічається лейкоцитоз, лімфоцитоз, нормальна швидкість осідання еритроцитів. Про яке захворювання слід подумати?

- A.** Кашлюк
- B.** Пневмонія
- C.** Бронхіальна астма
- D.** Плеврит
- E.** ГРВІ

102. Дівчинка 5-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до $37,9^{\circ}\text{C}$, розлад випорожнень. Об'єктивно: шкіра бліда, живіт запалий, сигмовидна кишка спазмована, пальпується у вигляді тяжа, болюча. Випорожнення скудні зі слизом, зеленню, прожилками крові до 10-15 разів на добу, періодичні тенезми. Яке захворювання найбільш імовірно?

- A.** Шигельоз
- B.** Сальмонельоз
- C.** Іерсиніоз
- D.** Ешеріхіоз
- E.** Ротавірусна інфекція

103. При проведенні профілактичного огляду дитини 11-ти місяців у сімейній амбулаторії медсестра звернула увагу на блідість шкіри та слизових оболонок. З анамнезу стало відомо, що дитина виключно на грудному вигодовуванні, прикормів не отримує. До якого лабораторного дослідження треба підготувати дитину для встановлення діагнозу?

- A.** Загальний аналіз крові
- B.** Загальний аналіз сечі
- C.** Копрограма
- D.** Печінкові проби
- E.** Кров на ревмокомплекс

104. Ви - дитяча медсестра перинатального центру. Якою вакциною Ви будете проводити щеплення недоношеній новонародженій дитині з масою 2100 г на 3-й день життя?

- A.** БЦЖ-М
- B.** БЦЖ
- C.** "Інжерікс"
- D.** АКДП
- E.** АаКДП

105. На 2-й день життя у новонародженої дитини шкіра пожовтіла. Рівень загального білірубіну складає 300 мкмоль/л за рахунок непрямой фракції. Група крові дитини - B (III) Rh(+), у матері - кров групи 0(I) Rh(+). Який стан найбільш імовірний у даному випадку?

- A.** Гемолітична хвороба новонароджених за системою АВ0
- B.** Гемолітична хвороба новонароджених за резус-фактором
- C.** Вроджений гепатит
- D.** Атрезія жовчовивідних протоків
- E.** Кон'югаційна жовтяниця

106. У дитячій поліклініці було проведено статистичне дослідження захворюваності дітей, які звернулися до дитячої поліклініки протягом року. Розподіл досліджуваної групи проводили за віком та статтю. Який вид таблиць доцільно використати для зведення отриманих даних?

- A.** Комбінаційна
- B.** Проста
- C.** Складна
- D.** Групова
- E.** Комбінована

107. В результаті ускладнених пологів народилась недоношена дитина, яка померла на 35-ту добу життя. В який показник ввійде цей випадок?

- A.** Постнеонатальна смертність
- B.** Перинатальна смертність
- C.** Неонатальна смертність
- D.** Рання неонатальна смертність
- E.** Загальний показник смертності

108. Пацієнтка 50-ти років звернулась в лікувальний заклад зі скаргами на підвищення температури тіла, втрату апетиту, артралгію, біль в серці, еритематозну висипку на обличчі у вигляді "метелика"

Які лабораторні показники є найбільш діагностично інформативні?

- A.** LE-клітини
- B.** ШОЕ
- C.** Гемоглобін
- D.** С-реактивний білок
- E.** Ревматоїдний фактор

109. У пацієнта проктологічного відділення 34-х років виявлено скарги на біль під час дефекації, виділення слизу та крові з калом протягом одного тижня. Виберіть метод дослідження, інформативний для встановлення діагнозу:

- A.** Ректороманоскопія
- B.** Рентгеноскопія
- C.** Ультразвукове обстеження
- D.** Гастроскопія
- E.** Фіброгастроєзофагоскопія

110. Під час клінічного обстеження пацієнта 63-х років виявлено: стан важкий, шкіра бліда, Рс- 125/хв., АТ- 80/55 мм рт.ст. Язик сухий, обкладений. При пальпації живіт м'який, болючий в навколупупковій ділянці. Позитивний симптом Валя, шум плеску. Який попередній діагноз?

- A.** Кишкова непрохідність
- B.** Гострий холецистит
- C.** Гострий панкреатит
- D.** Ниркова колька
- E.** Гострий апендицит

111. В приймальне відділення поступив пацієнт 76-ти років зі скаргами на утруднене сечовиділення. Він відмітив, що сеча стала виділятися тонким струменем, іноді краплями. Почало турбувати часте сечовипускання вночі. Який попередній діагноз?

- A.** Аденома передміхурової залози
- B.** Гострий простатит
- C.** Хронічний простатит
- D.** Туберкульоз сечового міхура
- E.** Сечокам'яна хвороба

112. Ви проводите клінічне обстеження пацієнта 27-ми років з термічним опіком лівої ступні. Шкіра в місці ушкодження стала щільною, набула темно-коричневого кольору, з'явилась чітка межа із непошкодженими тканинами. Рухи і чутливість пальців відсутні. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Суха гангрена
- B.** Хімічний опік III ст.
- C.** Хімічний опік II ст.
- D.** Волога гангрена
- E.** Термічний опік IV ст.

113. Ви проводите клінічне обстеження пацієнта 46-ти років, який поступив у торакальне відділення з ножовим пораненням грудної клітки, ускладненим ушкодженням легенів. Здійснена операція - пульмонектомія, призначено дренирування плевральної порожнини. Виберіть, який із дренажів плевральної порожнини є пасивним:

- A.** Дренаж за методом Бюлау
- B.** Дренаж за допомогою 3-х ампульної системи
- C.** Дренаж за допомогою електровідсмоктувача
- D.** Дренаж за допомогою водострумного пристрою
- E.** Дренаж за допомогою гумового балончика

114. В травматологічне відділення лікарні доставлено пацієнта 20-ти років з проникаючим пораненням грудної клітки. Під час клінічного обстеження в VI міжребер'ї виявлено різану рану розміром 2,5x1 см, з якої витікає піниста кров, а під час дихання чути свист повітря. Який попередній діагноз?

- A.** Відкритий пневмоторакс
- B.** Клапанний пневмоторакс
- C.** Закритий пневмоторакс
- D.** Підшкірна емфізема
- E.** Легенева кровотеча

115. В приймальне відділення звернувся хворий зі скаргами на головний біль, втрату апетиту, підвищення температури тіла до 39°C, біль в ділянці лівого стегна. Хворіє протягом 10 днів. Об'єктивно: в середній третині правого стегна - набряк м'яких тканин, гіперемія, місцеве підвищення температури. При рентгенологічному дослідженні виявлено відшарування окістя. Який найбільш імовірний діагноз?

- A.** Остеомієліт
- B.** Флегмона
- C.** Панарицій
- D.** Бешиха
- E.** Забій м'яких тканин

116. Медична сестра-статист проводить розрахунки для проведення статистичного дослідження в лікувальному закладі. Скільки етапів передбачає проведення статистичного дослідження?

- A. 4 етапи
- B. 5 етапів
- C. 3 етапи
- D. 2 етапи
- E. 1 етап

117. Медичний працівник на дільниці проводить диспансеризацію пацієнтів. Скільки етапів включає в себе диспансеризація?

- A. 3 етапи
- B. 2 етапи
- C. 1 етап
- D. 4 етапи
- E. 5 етапів

118. У дитини 5-ти місяців наявні тотальний ціаноз шкіри та слизових оболонок, поліцитемія (кількість еритроцитів - 5,7 Т/л), конфігурація серця при рентгенологічному дослідженні у вигляді "дерев'яного черевичка". Для якої вади серця найбільш характерні ці ознаки?

- A. Тетради Фалло
- B. Дефект міжпередсердної перегородки
- C. Дефект міжшлуночкової перегородки
- D. Відкрита артеріальна протока
- E. Коарктація аорти

119. Дівчинка, яка хворіє на епідемічний паротит, скаржить на головний біль, шум та біль у вухах, при відкриванні рота, припухлість привушної залози. Який симптом виявиться у ротовій порожнині?

- A. Симптом Мурсона
- B. Плями Філатова-Коплика-Бельського
- C. Енантема на твердому піднебінні
- D. "Географічний язик"
- E. "Малиновий язик"

120. У медичному закладі складений документ, у якому зроблено розпис грошових прибутків і витрат закладу на майбутній фінансовий рік. При цьому були вказані джерела дохідної частини й статті витрат грошових засобів із розрахунками. Який фінансовий документ складено у даному медичному закладі?

- A. Кошторис закладу
- B. Бюджет закладу
- C. Фінансовий звіт
- D. План зростання виробництва
- E. Фінансовий запит

121. Охорона здоров'я фінансується з різних джерел. Яке основне джерело фінансування галузі охорони здоров'я при страховій формі фінансування?

- A. За рахунок внесків робітників, підприємців і субсидій держави
- B. За рахунок державного бюджету
- C. За рахунок оплати медичних послуг за власні кошти пацієнтів
- D. За рахунок міжбюджетних трансферів
- E. За рахунок гуманітарної допомоги

122. До медсестри сімейного лікаря звернулася пацієнтка із скаргами на сильний біль у потилиці, мерехтіння мушок перед очима, запаморочення, нудоту, що виникли після стресової ситуації. Пацієнтка збуджена, обличчя гіперемоване, Рs- 94/хв., АТ- 190/100 мм рт.ст. Який лікарський препарат потрібний для надання невідкладної допомоги?

- A. Дибазол
- B. Кофеїн
- C. Строфантин
- D. Анальгін
- E. Дицинон

123. До приймального відділення госпіталізовано пацієнта із скаргами на загальну слабкість, запаморочення, шум у вухах, блювання "кавовою гущею", випорожнення дьогтеподібного характеру. В анамнезі - виразкова хвороба шлунка. Яке ускладнення запідозрить медсестра у пацієнта?

- A. Шлункова кровотеча
- B. Перфорація виразки
- C. Пенетрація виразки
- D. Легенева кровотеча
- E. Стравохідна кровотеча

124. У приймальне відділення доставлено пацієнта зі скаргами на набряк губ, обличчя, повік, носа, які виникли після укусу бджоли. Об'єктивно: набрякле обличчя, АТ- 110/70 мм рт.ст. Рs- 74/хв. Який стан виник у пацієнта?

- A. Набряк Квінке
- B. Кропив'янка
- C. Анафілактичний шок
- D. Гіпотиреоз
- E. -

125. Медсестра працює в перев'язувальному кабінеті хірургічного відділення. Лікар призначив пацієнту з гнійною раною застосувати протеолітичні ферменти під час наступної перев'язки. Назвіть мету їх застосування:

- A. Лізис некротичних тканин
- B. Знеболювання
- C. Поліпшення кровообігу тканин
- D. Утворення лінійного рубця
- E. Зменшення температури тіла

126. Під час бійки постраждалий 33-х років отримав відкрите проникаюче поранення передньої черевної стінки з випадінням петель кишок на зовні. Що з пацієнтом?

- A.** Евентрація
- B.** Перфорація
- C.** Пенетрація
- D.** Малігнізація
- E.** Ексудація

127. Під час проведення проби на резус-сумісність крові донора та реципієнта в пробірці відбулась реакція аглютинації. Вкажіть, який висновок зробить медична сестра з записом в медичну документацію:

- A.** Несумісна по Rh-фактору
- B.** Резус-позитивна
- C.** Сумісна по Rh-фактору
- D.** Резус-негативна
- E.** Пробу треба переробити

128. Вас викликають в приймальне відділення з метою допомогти приймати поранених після пожежі. Потерпілий 28-ми років, отримав опік полум'ям передньої поверхні обох ніг, грудей і живота. Визначте площу опікової поверхні:

- A.** 36%
- B.** 56%
- C.** 42%
- D.** 25%
- E.** 18%

129. Існує декілька моделей медичного страхування. Як називається модель, яка базується на принципах універсальності доступу та безкоштовності медичної допомоги на основних етапах курсу лікування?

- A.** Модель Беверіджа
- B.** Модель Семашка
- C.** Модель Бісмарка
- D.** Приватна модель
- E.** Фінансова модель

130. Ви - старша медична сестра терапевтичного відділення. У вашому розпорядженні є гумові вироби. При якій вологості їх слід зберігати?

- A.** Вологість не менше 65%
- B.** Вологість не менше 30%
- C.** Вологість не менше 45%
- D.** У прохолодному місці, вологість 25%
- E.** Вологість не менше 50%

131. Медична сестра-бакалавр після закінчення медичного коледжу отримала направлення на роботу. Протягом якого

терміну вона повинна приступити до роботи?

- A.** У термін, визначений у направленні
- B.** 20 календарних днів
- C.** 12 календарних днів
- D.** 7 календарних днів
- E.** 25 календарних днів

132. Медична сестра потребує відпустки за сімейними обставинами. Який термін відпустки без збереження заробітної плати вона може вказати в заяві?

- A.** 15 календарних днів
- B.** 5 календарних днів
- C.** 3 календарних днів
- D.** Два тижні
- E.** 10 календарних днів

133. Здоров'я населення характеризується комплексом демографічних показників, показників захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку. Який з наведених показників належить до демографічних?

- A.** Народжуваність
- B.** Первинна захворюваність
- C.** Летальність
- D.** Інвалідність
- E.** Травматизм

134. У місті проведено наукове дослідження щодо вивчення патологічної ураженості школярів хворобами серцево-судинної системи. Що буде одиницею спостереження в такому дослідженні?

- A.** Кожен випадок хвороби серцево-судинної системи, виявлений на медичному огляді
- B.** Кожен школяр міста, що хворів протягом року
- C.** Кожен випадок захворювання серцево-судинної системи за даними звертань за медичною допомогою
- D.** Кожен школяр міста з хворобою серцево-судинної системи
- E.** Кожен школяр міста з будь-яким захворюванням

135. Концепція розвитку системи охорони здоров'я в умовах ринкової економіки чітко орієнтує суспільство на сприйняття медицини не тільки як моральної, юридичної, а насамперед як соціально-економічної категорії. Розкрийте зміст економіки охорони здоров'я:

- А.** Наука, що вивчає економічні відносини в охороні здоров'я
- В.** Бухгалтерський облік в ЛПЗ
- С.** Методи зниження собівартості лікування
- Д.** Витрати держави на охорону здоров'я
- Е.** Витрати держави на утримання ЛПЗ

136. Ціна має багато функцій. Яка із функцій ціни мотивує підвищення ефективності господарювання, забезпечення необхідної прибутковості?

- А.** Стимулююча
- В.** Обліково-вимірвальна
- С.** Розподільча
- Д.** Регулююча
- Е.** Порівняльна

137. В приймальне відділення привезли хворого після автоаварії. Хворий без свідомості, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рs- 97/хв., із носа і вух витікають кров та ліквор. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- А.** Перелом основи черепа
- В.** Перелом склепіння черепа
- С.** Перелом лицевої частини черепа
- Д.** Струс мозку
- Е.** Субдуральна гематома

138. Хворий 27-ми років упав на витягнуту праву верхню кінцівку. Скаржиться на біль, неможливість активних і різке обмеження пасивних рухів у плечовому суглобі. Під час огляду: правий плечовий суглоб деформований, його контури згладжені. Кінцівка фіксована у вимушеному положенні (відведена вбік). Ушкоджене плече довше. На місці головки правого плеча - западина. Поставте діагноз:

- А.** Вивих плеча
- В.** Перелом плечової кістки
- С.** Розрив зв'язок плечового суглоба
- Д.** Розрив двоголового м'яза
- Е.** Забій плеча

139. У приймальному відділенні інфекційної лікарні дитина віком 2-х років, якій не були проведені профілактичні щеплення. З анамнезу відомо, що захворювання почалося з підвищення температури до 39°C , головного болю, нудоти, блювання, болю у ногах та спині. На ранок не змогла стати на ніжки. Про яке захворювання можна думати?

- А.** Поліомієліт
- В.** Вірусний гепатит В
- С.** Краснуха
- Д.** Кір
- Е.** Скарлатина

140. У здорової новонародженої дитини виявлені наступні показники периферичної крові: еритроцити - $6,0 \cdot 10^{12}/\text{л}$, гемоглобін - 150 г/л, лейкоцити - $15 \cdot 10^9/\text{л}$, нейтрофіли - 45%, лімфоцити - 43%. Для якого віку характерні такі показники периферичної крові?

- А.** П'ятий день життя
- В.** Перший день життя
- С.** Десятий день життя
- Д.** Двадцятий день життя
- Е.** Тридцятий день життя

141. Дівчинка 7-ми років хворіє 3 дні, скаржиться на періодичний ниючий біль в поперековій ділянці, часте болоче сечовипускання. В загальному аналізі сечі кількість лейкоцитів становить 16 в полі зору. Яку патологію сечовивідної системи можна запідозрити в даному випадку?

- А.** Інфекція сечовивідних шляхів
- В.** Гострий гломерулонефрит
- С.** Хронічний гломерулонефрит
- Д.** Хронічний пієлонефрит
- Е.** Хронічна ниркова недостатність

142. Дитині 8-м років. Під час профілактичного огляду медична сестра-бакалавр виявила асиметрію кутів лопаток, рівня плечей, трикутників талії та S-подібне викривлення грудного відділу хребта. Клінічні симптоми дозволяють запідозрити:

- А.** Сколіоз грудного відділу хребта
- В.** Кіфоз грудного відділу хребта
- С.** Лордоз грудного відділу хребта
- Д.** Хондродистрофію
- Е.** Залишкові явища перенесеного рахіту

143. При огляді у приймальному відділенні непритомна дівчинка 11-ти років. Зіниці звужені. Наявні ознаки зневоднення, дихання типу Куссмауля, різкий запах ацетону з рота. Тахікардія - 98/хв., артеріальний тиск знижений. Глюкоза крові - 29 ммоль/л. Який стан найбільш імовірний у дитини?

- А.** Гіперглікемічна кома
- В.** Гіпоглікемічна кома
- С.** Гіпоксична кома
- Д.** Інфузійно-токсичний шок
- Е.** Гіповолемічний шок

144. Хворий 45-ти років на виробництві отримав пошкодження м'яких тканин лівого стегна. На передній поверхні стегна рана, краї якої зазубрені, нерівні, зі згустками крові. З рани продовжує витікати кров. Який оптимальний метод тимчасо-

вої зупинки кровотечі може застосувати медична сестра?

- A.** Стискаюча пов'язка на рану
- B.** Пальцеве притиснення артерії
- C.** Максимальне згинання кінцівки
- D.** Джгут вище місця поранення
- E.** Джгут нижче місця поранення

145. Хворий 19-ти років з дитинства страждає на підвищену кровоточивість. Після незначних травм виникають масивні підшкірні та внутрішньом'язові гематоми. Мати та сестра - здорові. Тромбоцити крові - $190 \cdot 10^9/\text{л}$. Про яке захворювання можна думати у цьому випадку?

- A.** Гемофілія А
- B.** Тромбоцитопенія
- C.** Тромбоцитопатія
- D.** ДВЗ-синдром
- E.** Геморагічний васкуліт

146. Хворий 64-х років скаржиться на кашель з відходженням харкотиння, іноді кровохаркання. Палить 30-ть років. Схуд на 8 кг за останні 3 місяці. Рентгенологічно в середній частці правої легені порожнинне утворення, справа збільшені прикореневі лімфовузли. Яке дослідження є найбільш інформативним?

- A.** Бронхоскопія з біопсією
- B.** Загальний аналіз крові
- C.** Спірографія
- D.** Бронхографія
- E.** Біохімічний аналіз крові

147. У чоловіка 23-х років через три тижні після ангіни з'явилися набряки обличчя, гомілок, відчуття дискомфорту у попереку, підвищення АТ до 180/100 мм рт.ст. В сечі протеїнурія - 0,99 г/л, вилужені еритроцити 60-80 в полі зору, циліндри. Це дозволяє запідозрити захворювання:

- A.** Гострий гломерулонефрит
- B.** Гіпертонічна хвороба
- C.** Гострий пієлонефрит
- D.** Сечокам'яна хвороба
- E.** Рак нирки

148. До приймального відділення доставили хвору зі скаргами на слабкість, головний біль, біль у ділянці серця. При обстеженні: екзофтальм, гіперемія шкіри, тремтіння кінцівок, температура тіла - $38,2^{\circ}\text{C}$, пульс - 150/хв., АТ- 165/90 мм рт.ст. Яке захворювання слід запідозрити?

- A.** Тиреотоксикоз
- B.** Гіпертонічна хвороба
- C.** Інфаркт міокарда
- D.** Гіпотиреоз
- E.** -

149. Хто має право видати документ працюючій особі, що засвідчує тимчасову непрацездатність, на період лікування в стаціонарі?

- A.** Лікуючий лікар разом із завідуючим відділенням
- B.** Лікуючий лікар
- C.** Завідувач відділенням
- D.** Головний лікар або його заступник (начмед)
- E.** Лікарська консультативна комісія

150. В аптеці необхідно придбати шовний матеріал, що не розсмоктується. Який із перелічених шовних матеріалів повинен відпустити фармацевт?

- A.** Лавсан
- B.** Кетгут
- C.** Вікріл
- D.** Окцелон
- E.** Дексон

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”.

ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ: КРОК Б. СЕСТРИНСЬКА СПРАВА.

Київ. Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”.
(Українською мовою).

Підписано до друку 05.05/№65. Формат 60x84 1/8
Папір офсет. Гарн. Times New Roman Cyr. Друк офсет.
Ум.друк.арк. 16. Облік.вид.арк. 20.
Тираж.(282 прим. – укр. мова).

Б		мерзлякуватість	зябкість	рукавичка	перчатка
бешиха	рожа	мета	цель	рідина	жидкость
блідість	бледность	мигдалик	миндалина	рух	движение
блювання	рвота	миготливий	мерцательный	рухливість	подвижность
блювотний	рвотный	міжшлуночковий	межжелудочковый	С	
В		міський	городской	самогубство	самоубийство
вагітність	беременность	міхур	пузырь	свербіж	зуд
вигодовування	вскармливание	млявий	вялый	своєчасний	своевременный
вिलичний	скуловой	Н		сеча	моча
виразка	язва	набряк	отёк	синець	синяк
виробничий	производственный	нагубання	набухание	скельце	стёклышко
виснаження	истощение	надмірний	избыточный	склад	состав
висновок	вывод	наочність	наглядность	слабодухість	слабодушие
витрати	расходи	напередодні	накануне	слинотеча	слинотечение
відраза	отвращение	напружений	напряженный	собівартість	себестоимость
відрижка	отрыжка	народжуваність	рождаемость	спадковість	наследственность
вогнищевий	очаговый	натще	натощак	споживач	потребитель
вологість	влажность	нашарування	наслоение	сполука	соединение
воротар	привратник	недостатність	недостаточность	справжній	истинный
втомлюваність	утомляемость	нежить	насморк	стать	пол
втручання	вмешательство	незбираний	цельный	стискаючий	давящий
вуглеводень	углеводород	нездужання	недомогание	струміль	струя
вуглець	углерод	необгрунтований	необоснованный	суглоб	сустав
вузловий	узловой	непритомність	обморок, потеря	сумісність	совместимость
Г		нирка	почка	суміш	смесь
гавкаючий	лающий	нориця	свиц	сумний	грустный
галузевий	отраслевой	нудота	тошнота	супровідний	сопроводительный
годинник	часы	О		сутінковий	сумеречный
годування	кормление,	обличчя	лицо	схуднення	похудение
голка	иголка	облік	учёт	Т	
гомілка	голень	оглядовий	обзорный	терміновий	экстренный
гострик	острица	ознака	признак	тиждень	неделя
гумовий	резиновый	олія	масло	тиск	давление
густина	плотность	оперізуючий	опоясывающий	тім'ячко	родничок
Д		оприбуткування	оприходование	травний	пищеварительный
державний	государственный	опік	ожог	тривалий	длительный
дертя	першение	отруєння	отравление	туга	тоска
діжка	бочка	отрутохімікат	ядохімікат	тулуб	туловище
добування	добыча	оцет	уксус	У	
догляд	уход	очеревина	брюшина	умови	условия
доповідь	доклад	П		уникнення	избегание
дратівливість	раздражительность	паління	курение	уповноважений	уполномоченный
Ж		пальпується	пальпируется	ураження	поражение
жовтяниця	желтуха	папір	бумага	ускладнення	осложнение
З		пахвинний	паховый	усунення	устранение
забій	ушиб	пахвовий	подмышечный	Х	
загоєння	заживление	передміхуровий	предстательный	харкотиння	мокрота
залежність	зависимость	плодючість	плодовитость	харчування	питание
запаморочення	головокружение	повіки	веки	хвороба	болезнь
запобігання	предотвращение	позалікарняний	внебольничный	хиба	погрешность
затерпність	онемение	попит	спрос	хода	походка
зберігання	хранение	послуга	услуга	хребет	позвоночник
зведення	сводка	потилиця	затылок	Ц	
зіниця	зрачок	поточний	текущий	цівка	струйка
зіставити	сопоставить	поштовхоподібний	толчкообразный	цукор	сахар
зміст	содержание	правець	столбняк	цукровий	сахарный
знеболювання	обезболивание	прибуток	прибыль	Ч	
І		приглухуватість	тугоухость	чадний	угарный
істотно	существенно	пригнічений	угнетённый	черговий	дежурный
К		присмак	привкус	чергування	дежурство
каламутний	мутный	пухирець	пузырёк	черевний	брюшной
квасоля	фасоль	променевиї	лучевой	черевце	брюшко
керівництво	руководство	просування	продвижение	Ш	
кінцівка	конечность	пухлина	опухоль	шар	слой
клекочучий	клокочущий	Р		шкіра	кожа
кошторис	смета	раптово	внезапно	шкірний	кожний
кукса	культя	ризик	риск	шлунок	желудок
кульгавість	хромота	рідина	жидкость	штучний	искусственный
кульшовий	тазобедренный	рідкий	жидкий	Щ	
кут	угол	рогівка	роговица	щелепа	челюсть
Л		родзинки	изюм	щеплення	прививка
литковий	икроножный	роділля	роженница	щур	крыса
лоно	лобок	розбіжність	расхождение	Я	
лужний	щелочной	розвантажувальний	разгрузочный	ядуха	удушьє
лусочка	чешуйка	розпал	разгар	якість	качество
М		розпитування	расспрос	ясна	дёсна
марення	бред	розтин	сечение		