

BUKOVINIAN STATE
MEDICAL UNIVERSITY

BIMCO JOURNAL

ABSTRACTS BOOK

CHERNIVTSI **2018**

Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство освіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти
Вищий державний навчальний заклад України
"Буковинський державний медичний університет"
Студентське наукове товариство
Рада молодих вчених

Ministry of Healthcare of Ukraine
Ministry of Education and Science of Ukraine,
State Scientific Institution "Institute of Educational Content Modernization"
Higher State Educational Establishment of Ukraine
«Bukovinian State Medical University»
Students Scientific Society
Council of Young Scientists

Министерство здравоохранения Украины
Министерство образования и науки Украины
Институт модернизации содержания образования
Высшее государственное учебное заведение Украины
"Буковинский государственный медицинский университет"
Студенческое научное общество
Совет молодых ученых

BIMCO JOURNAL

ABSTRACTS BOOK

Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, BIMCO 2018.

Abstract book of the Bukovinian International Medical Congress 2018.

Сборник материалов Буковинского международного медико-фармацевтического конгресса студентов и молодых ученых, BIMCO 2018.

Головний редактор
д.мед.н., проф. Т.М.Бойчук

Editor-in-chief
Prof. T.M. Boychuk M.D.

Главный редактор
д.м.н., проф. Т.М.Бойчук

Заступник головного редактора
к.мед.н., доц. О.А.Тюленева

Co-Editor-in-chief
Ass. Prof. O.A. Tiulienieva Ph.D.

Заместитель главного редактора
к.м.н., доц. О.А.Тюленева

Відповідальний секретар
С.Л. Говорнян

Secretary
S.L. Novornyan

Ответственный секретарь
С.Л. Говорнян

Адреса редакції: 58002, Чернівці, пл. Театральна, 2, СНТ БДМУ.
Тел./факс: (03722) 3-52-62; (0372) 55-17-39. E-mail: snt@bsmu.edu.ua
Повнотекстова версія журналу представлена на сайті: <http://bim.co.ua/>

Edition address : 58002, 2 Theatralna sq., Chernivtsi, SSS BSMU.
Tel./Fax: +38(03722)3-52-62; +38(0372)55-17-39. E-mail: snt@bsmu.edu.ua
Full text can be downloaded at: <http://bim.co.ua/>

Адрес редакции: 58002, Черновцы, ул. Театральная, 2, СНО БГМУ.
Тел. / Факс: (03722) 3-52-62; (0372) 55-17-39. E-mail: snt@bsmu.edu.ua
Полный текст журнала представлена на сайте: <http://bim.co.ua/>

Чернівці, 2018

Chernivtsi, 2018

Черновцы, 2018

Рецензенти та коректори:

Білоус Т.М.
Ватаманеску Л.І.
Войткевич Н.І.
Гараздюк М.С.
Гринько Н.В.
Грозав А.М.
Дрозд В.Ю.
Зеленюк В.Г.
Козловська І.М.
Палис С.Ю.
Повар М.А.
Присяжнюк В.П.
Хлуновська Л.Ю.

Reviewers and Correctors:

Bilous T.M.
Drozd V.Iu.
Garazdiuk M.S.
Grozav A.M.
Grynko N.V.
Khlunovska L.Iu.
Kozlovska I.M.
Palis S.Iu.
Povar M.A.
Prysiashniuk V.P.
Vatamanesku L.I.
Voitkevych N.I.
Zeleniuk V.H.

Рецензенты и корректоры:

Билоус Т.М.
Ватаманеску Л.И.
Войткевич Н.И.
Гараздюк М.С.
Гринько Н.В.
Грозав А.М.
Дрозд В.Ю.
Зеленюк В.Г.
Козловская І.М.
Палис С.Ю.
Повар М.А.
Присяжнюк В.П.
Хлуновская Л.Ю.

**Дизайн та верстка:
Говорнян С.Л.**

**Design and cover:
Novornyan S.L.**

**Дизайн и верстка:
Говорнян С.Л.**

Матеріали друкуються українською, англійською та російською мовами. Рукописи рецензуються. Редколегія залишає за собою право редагування. Передрук можливий за письмової згоди редколегії.

Видається згідно з постановою Вченої ради Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет"

Materials are printed in Ukrainian, English and Russian. Manuscripts are reviewed. The editorial board reserves the right to edit. Reprinting is possible with the written consent of the editorial board.

Issued due to the decision of the Academic Council of Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University»

Материалы печатаются на украинском, английском и русском языках. Рукописи рецензируются. Редколлегия оставляет за собой право редактирования. Перепечатка возможна по письменному согласию редколлегии.

Издается согласно постановлению Ученого совета Высшего государственного учебного заведения Украины "Буковинский государственный медицинский университет"

ISSN 2616-5392

© "BIMCO Journal" - Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених, BIMCO 2018.

© "BIMCO Journal" - Abstract book of the Bukovinian International Medical Congress 2018.

© "BIMCO Journal" - Сборник материалов Буковинского международного медико-фармацевтического конгресса студентов и молодых ученых, BIMCO 2018.

© Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет", 2018

© Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University», 2018

© Высшее государственное учебное заведение Украины "Буковинский государственный медицинский университет", 2018

Нікоряк Р. А.

**СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
БУКОВИНСЬКОГО РЕГІОНУ**Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка
(науковий керівник - к.мед.н. Русіна С. М.)

Внаслідок скрутної економічної ситуації та безробіття безліч буковинців залишають свої сім'ї, своїх дітей, свій дім у пошуках кращого заробітку на чужих теренах. Згідно зі звітом Генерального Секретаря ООН з моніторингу світового населення, присвяченому міжнародній міграції та розвитку, Україна посідає четверте місце за кількістю міжнародних мігрантів. Так, близько 20 млн. українців живуть за межами України як закордонні українці, а близько 8 млн. є трудовими мігрантами. Чернівецька область за кількістю трудових мігрантів посідає друге місце в Україні після Закарпатської області. Втративши надію працювати вдома, на чужині заробітчани погоджуються на будь-які пропозиції. Україна продовжує залишатися країною-експортером робочої сили. Вказана проблема відносно нова для сучасної психіатрії в Україні, значна за своїм медико-соціальним значенням, що обумовлює необхідність її ретельного вивчення і дослідження з можливістю практичного вирішення.

Експериментально-психологічний, клініко-психопатологічний і статистичний.

Серед 70 обстежених чоловіки склали 43% (30) осіб, а жінки - 57% (40) осіб. За допомогою розробленого скринінг-тесту встановлено, що серед чоловіків стресостійкими були 17%, а стресовразливими - 83% осіб у співвідношенні 1:5 ($p < 0,05$). Чоловіки, яким важко було переносити стрес, відмічали у себе наявність підвищеної дратівливості та агресії частіше вербальної у випадку незгоди із неблагоприємними обставинами. Натомість, жінки виявилися 100% стресовразливими. Важливою психологічною проблемою трудових мігранток молодого віку 55% (22) осіб була сепарація (віддалення від значущих в їхньому житті людей) від малолітніх дітей. Жінки середнього віку 45% (18) осіб на перше місце виставляли необхідність "забезпечити родину матеріально за будь-яких умов". Серед чоловіків, які важко переносили стрес 15 (50%) чол. відмічали через ізоляцію від родини, друзів; 6 (20%) осіб через втрату роботи за спеціальністю, зміни обов'язків праці (за меншовартістю), життєвих умов (некомфортних); 4 (13%) чол. через втрату особистітних звичок, способу розважатися; 5 (17%) осіб виявилися стресостійкими.

Таким чином, за даними проведених досліджень, встановлено, що основними причинами виїзду трудових мігрантів є необхідність заробити гроші з метою покращення свого економічного становища за відсутності достойнооплачуваної роботи в регіоні. Однак трудова міграція не завжди і не у всіх людей проходить без психологічних навантажень. Дана проблема потребує ретельного вивчення.

Очилов У. У., Тураев . М., Алкаров Р. Б., Тургунбоев А. У.

**ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ УПОТРЕБЛЯЮЩИХ
ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ**Самаркандский государственный медицинский институт, Самарканд, Узбекистан
Кафедра психиатрии, медицинской психологии и наркологии
(научный руководитель - к.мед.н. Велиляева А. С.)

Введение. Изучение степени выраженности психических расстройств у больных, употребляющих ПАВ с ВИЧ-инфекцией, способствует улучшению оказания им медико-социальной помощи. Психические расстройства у пациентов с неизлечимыми заболеваниями нельзя считать неизбежными и не нуждающимися в лечении. Психическое состояние не только ухудшает жизнь больных, но и затрудняет проведение основного терапевтического вмешательства, так как отмечаются нарушения соблюдения лечебных назначений. Депрессивное расстройство у ВИЧ-инфицированных существенно снижает способность к самостоятельному решению проблем, связанных с психологической адаптацией к заболеванию, ухудшая, тем самым, социально-психологические характеристики заболевших. В связи с этим изучение формирования психических расстройств у больных, употребляющих ПАВ с ВИЧ-инфекцией, является весьма актуальной.

Цель исследования. Изучение формирования психических расстройств у больных, употребляющих ПАВ с ВИЧ-инфекцией. Материалы и методы исследования. Было проведено исследование 280 больных употребляющих ПАВ с ВИЧ-инфекцией живущих в городской и районной местности, состоящих на учете в областном наркологическом диспансере г. Самарканда. Больные были разделены на две группы: городское население (176 больных - 62,9 %) и население района (104 больных - 37,1 %). Формирование психических расстройств, особенно депрессивных состояний оценивалось в соответствии с медицинскими документациями, объективного осмотра и проводились клинико - психологические тесты по разработанной специалистами Образовательного комитета ГАЛЕН.

Результаты исследования. По сравнению развития депрессивной симптоматики в городской и районной местности среди больных употребляющих ПАВ с ВИЧ-инфекцией достоверность различия между группами была следующей: упадок сил, утомляемость (город/район 35/58, $p < 0,001$); расстройства сна, особенно раннее пробуждение (88/137, $p < 0,001$); сниженный аппетит (82/129, $p < 0,001$); психомоторное возбуждение или заторможенность (33/45, $p < 0,001$); сниженное настроение большую часть времени, особенно по утрам (88/138, $p < 0,001$); нерешительность (16/22, $p < 0,001$); чувство и вины собственной бесполезности (61/97, $p < 0,001$); пессимистические взгляды, отсутствие надежд на будущее (71/112, $p < 0,001$); суицидальные мысли и попытки (6/16, $p < 0,001$).

Выводы. Выявление формирования психических расстройств среди больных употребляющих ПАВ с ВИЧ-инфекцией позволит на ранних этапах заболевания разработать соответствующую психотерапевтическую тактику.