

**О.М.Юзько,
Т.Г.Фармазей**

Буковинська державна медична
академія, м. Чернівці

КЛІНІЧНО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРЕІНДУКЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ШИЙКИ МАТКИ У ВАГІТНИХ ЖІНОК

З метою порівняння різних методів підготовки шийки матки до пологів проведено аналіз пологів у групах вагітних з різними методами підготовки. I група – контрольна (100 жінок, які поступили на пологи без підготовки), II група з підготовкою глюкозо-вітамінно-екстрогено-кальцієвим фоном (60 жінок), III група з підготовкою шийки матки ламінаріями (22 жінки), IV група – двох етапної підготовки шийки матки: 1-й етап – естрогенний фон, 2-й етап – ламінарії (35 жінок), V група – підготовки шийки матки простагландінами (60 жінок). Необхідність в преіндукційній підготовці шийки матки ламінаріями була зумовлена перенесеною вагітністю (15 жінок), гестозами (20 жінок), патологічним прелімінарним періодом (6 жінок), хронічною внутрішньоутробною гіпоксією плоду (13 жінок), іншими причинами (Rh-конфлікт – 1, цукровий діабет – 1, антена-

тальна загибель плоду – 1). Порівнювалися особливості клінічного перебігу підготовки шийки матки, основні клінічні показники перебігу пологів, ефективність та безпечність різних методів підготовки, частота кесарського розтину, гнійно-запальні ускладнення в жінок порівнювальних груп, стан новонароджених, особливості перебігу післяпологового періоду. З'ясувалася залежність ефективності підготовки шийки матки від стану вегетативної нервової системи та базального тону мати.

Обґрунтовано висновки щодо показань та умов, при яких доцільно використовувати той чи інший метод підготовки шийки матки до пологів.

Clin. and experim. pathol. – 2004. – Vol. 3, №2. – P.180.

Надійшла до редакції 02.03.2004