

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ**  
**ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ**  
**«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»**  
**HIGHER STATE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF UKRAINE**  
**"BUKOVINIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY"**

Індексований у міжнародних наукометричних базах:

Academy (Google Scholar)  
Ukrainian Research & Academy Network  
(URAN)  
Academic Resource Index Research Bib

Index Copernicus International  
Scientific Indexing Services  
Включений до Ulrichsweb™ Global Serials  
Directory

**KLINICHNA TA  
EKSPERIMENTAL'NA  
PATOLOGIYA**

**CLINICAL & EXPERIMENTAL  
PATHOLOGY**

На всі статті, опубліковані в журналі «Клінічна та експериментальна патологія»,  
встановлюються цифрові ідентифікатори DOI

**Т. XVIII, №2 (68), 2019**

---

**Щоквартальний український  
науково-медичний журнал.  
Заснований у квітні 2002 року**

**Свідоцтво про державну реєстрацію  
Серія КВ №6032 від 05.04.2002 р.**

---

**Засновник і видавець:** Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

**Головний редактор**

С. С. Ткачук

**Перший заступник головного редактора**

В. Ф. Мислицький

**Відповідальні секретарі:**

С. Є. Дейнека

О. С. Хухліна

**Секретар**

Г. М. Лапа

**Наукові редактори випуску:**

д. мед. н., проф. Власик Л.І.

д. мед. н., проф. Колоскова О.К.

д. мед. н., проф. Полянський І.Ю.

**Редакційна колегія:**

Булик Р. Є.

Денисенко О. І.

Ілашук Т.О.

Коновчук В. М.

Федів О. І.

Полянський І. Ю.

Сорокман Т. В.

---

**Адреса редакції:** 58002, Чернівці, пл. Театральна, 2, видавничий відділ БДМУ.

**Тел./факс:** (0372) 553754. **Е-mail** [myslytsky@gmail.com](mailto:myslytsky@gmail.com) [vfmyslickij@bsmu.edu.ua](mailto:vfmyslickij@bsmu.edu.ua)

Повнотекстова версія журналу представлена на сайті <http://www.bsmu.edu.ua/files/KEP/>

Електронні копії опублікованих статей передаються до **Національної бібліотеки**

**ім. В.І. Вернадського** для вільного доступу в режимі on-line.

Реферати статей публікуються в "**Українському реферативному журналі**", серія "Медицина"

## Редакційна рада:

проф. А.В. Абрамов (Запоріжжя, Україна); проф. Е.М. Алієва (Баку, Азербайджан); проф. А.І. Березнякова (Харків, Україна); проф. В.В. Братусь (Київ, Україна); чл.-кор. НАН України, проф. В.М. Єльський (Донецьк, Україна); проф. І.М. Катеренюк (Кишинів, Республіка Молдова); проф. Ю.М. Колесник (Запоріжжя, Україна); акад. АН ВШ України, проф. С.С. Костишин; чл.-кор. АМН України, проф. В.А. Міхньов (Київ, Україна); чл.-кор. НАМН України, проф. М.Г. Проданчук; акад. АМН, чл.-кор. НАН України, О.Г. Резніков (Київ, Україна); чл.-кор. НАН України, проф. В.Ф. Сагач (Київ, Україна); чл.-кор. НАН України, проф. Р.С. Стойка (Львів, Україна); акад. НАМН, чл.-кор. НАН України М.Д. Тронько; проф. В.В. Чоп'як (Львів, Україна); проф. В.О. Шидловський (Тернопіль, Україна); проф. В. О. Шумаков (Київ, Україна).

---

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2014 р., № 1279 журнал "Клінічна та експериментальна патологія" включено до переліку наукових фахових видань України

---

Рекомендовано до друку та поширення через Інтернет рішенням вченої ради вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет (протокол № 10 від 23.05.2019 р.)

Матеріали друкуються українською, російською та англійською мовами

Комп'ютерний набір і верстка -  
М.П. Мотрук  
Наукове редагування - редакції

Рукописи рецензуються. Редколегія залишає за собою право редагування.

Редагування англійського тексту - Г. М. Лапи

Передрук можливий за письмової згоди редколегії.

Коректор - І.В. Зінченко

Група технічно- інформаційного забезпечення:  
І.Б. Горбатюк  
Л.І. Сидорчук  
В.Д. Сорохан

ISSN 1727-4338

DOI 10.24061/1727-4338.XVIII.2.68.2019

© "Клінічна та експериментальна патологія" (Клін. та експерим. патол.), 2019

© **Clinical and experimental pathology (Clin. and experim. pathol.), 2019**  
Founded in 2002  
Publishing four issues a year

© "Клиническая и экспериментальная патология" (Клин. и эксперим. патол.), 2019

# ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЛАЗЕРНОЇ АВТОФЛЮОРЕСЦЕНТНОЇ МІКРОСКОПІЇ ГІСТОЛОГІНИХ ЗРІЗІВ ПРЯМОГО М'ЯЗУ ЖИВОТА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ

*А-В. С. Сивокоровська*

Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет", Чернівці

**Ключові слова:**  
лазерна поляри-  
метрія, автоф-  
луоресцентна  
мікроскопія,  
гостра крововт-  
рата, судова  
медичина.

Клінічна та  
експериментальна  
патологія Т.18, №2  
(68). С.139-143.

DOI:10.24061/1727-  
4338.XVIII.2.68.2019.253

E-mail:  
syvokorovska.av  
@bsmu.edu.ua

**Мета роботи** - встановлення можливостей діагностики гострих крововтрат з використанням методу лазерної автофлуоресцентної мікроскопії гістологічних зрізів прямого м'язу живота.

**Матеріал та методи.** Об'єктом дослідження були нативні гістологічні зрізи прямого м'язу живота товщиною 30мкм з різним ступенем крововтрати. Для кожного зразка за допомогою спектрально-селективної флюоресцентної мікроскопії визначались координантні структури мап лазерної автофлуоресценції.

**Результати.** З одержаних даних про динаміку та сценарій зміни статистичних параметрів розподілів величини інтенсивності мап лазерної автофлуоресценції видно, що значення статистичних параметрів - середнього, дисперсії, асиметрії та ексцесу, які характеризують ступень деполаризації лазерного випромінювання гістологічними зрізами ПМЖ померлих, змінюються у межах об'єму крововтрати від 0 до 2500 мм<sup>3</sup>. Чутливим до змін інтенсивності лазерної автофлуоресценції зразків ПМЖ померлих з різним ступенем крововтрати виявився весь набір статистичних моментів 1-4-го порядків.

**Висновки.** Отримані результати підтверджують можливість використання методу лазерної автофлуоресцентної мікроскопії гістологічних зрізів прямого м'язу живота для діагностики гострої крововтрати та у перспективі відкриває можливості дослідження інших біологічних тканини з фібрилярною структурою та різним ступенем крововтрати.

**Ключевые слова:**  
табакокурение,  
осложнения,  
дисфункция  
плаценты,  
плацентарный  
лактоген.

Клиническая и  
экспериментальная  
патология Т.18, №2  
(68). С.139-143.

## ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ЛАЗЕРНОЙ АВТОФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ СРЕЗОВ ПРЯМОЙ МЫШЦЫ ЖИВОТА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ

*А-В. С. Сивокоровская*

**Цель работы** - установление возможностей диагностики острых кровопотерь с использованием метода лазерной автофлуоресцентной микроскопии гистологических срезов прямой мышцы живота.

**Материал и методы.** Объектом исследования были нативные гистологические срезы прямой мышцы живота толщиной 30 мкм с разной степенью кровопотери. Для каждого образца с помощью спектрально-селективной флюоресцентной микроскопии определялись координантные структуры карт лазерной автофлуоресценции.

**Результаты.** Из полученных данных о динамике и сценарий изменения статистических параметров распределений величины интенсивности карт лазерной автофлуоресценции видно, что значение статистических параметров - среднего, дисперсии, асимметрии и эксцесса, характеризующих степень деполаризации лазерного излучения гистологическими срезами ПМЖ умерших, изменяются в пределах объема кровопотери от 0 до 2500 мм<sup>3</sup>. Чувствительным к изменениям интенсивности лазерной автофлуоресценции образцов ПМЖ умерших с разной степенью кровопотери оказался весь набор статистических моментов 1- 4-го порядков.

**Выводы.** Полученные результаты подтверждают возможность использования метода лазерной автофлуоресцентной микроскопии гистологических срезов прямой мышцы живота для диагностики острой кровопотери и в перспективе открывает возможности исследования других биологических тканей с фибриллярной структурой и разной степенью кровопотери.

**Key words:**  
laser polarimetry,  
autofluorescent  
microscopy, acute

## PERSPECTIVES OF USING THE METHOD OF LASER AUTOFLUORESCENT MICROSCOPY OF HISTOLOGICAL SECTIONS OF THE RECTUS ABDOMINAL MUSCLE FOR DIAGNOSTICS OF ACUTE BLOOD LOSS

*A-V. S. Syvokorovska*

**The objective** of the paper was determination of diagnostics possibilities of acute blood loss using the laser autofluorescence microscopy of histological sections of the rectus abdominal muscle.

**Material and methods.** The object of the study were native histological sections of the rectus abdominal muscle of 30 micrometers thickness with various degree of the blood loss. The coordinate structures of the laser autofluorescence maps were determined for each sample using spectral-selective fluorescence microscopy.

**Results.** The value of statistical parameters - average, dispersion, asymmetry and kurtosis, characterizing the degree of depolarization of laser radiation by histological sections of the rectus abdominal muscle, varies within the volume of the blood loss from 0 to 2500 mm<sup>3</sup>. The whole set of parameters was sensitive to changes in the intensity of laser autofluorescence of samples of the rectus abdominal muscles with various degree of the blood loss.

**Conclusion.** The obtained results confirm the possibility of using the method of laser autofluorescence microscopy of the histological sections of the direct abdominal muscle for the diagnostics of acute blood loss, and in perspective discovers the possibility of studying other biological tissues with a fibrillary structure and different degree of the blood loss.

blood loss,  
forensic medicine.

Clinical and  
experimental  
pathology. Vol.18,  
№2 (68). P.xx-xx.

### Вступ

Гостра крововтрата - одна з причин смерті, що доволі часто трапляється серед усіх травматичних випадків у практиці лікаря судово-медичного експерта. Усі патоморфологічні зміни органів при крововтраті є неспецифічними, варіабельними та не дають відповідей на ряд питань, поставлених судово-слідчими органами перед експертом. Найбільш гостро стоїть питання про можливість виживання потерпілого при своєчасному наданні медичної допомоги.

На сьогодні успішно впроваджені в медичну практику методи лазерної поляриметрії для дослідження мікрорівня біологічних тканин [1-3]. У судово-медичній практиці можливості використання таких методів демонструють дослідження паренхіматозних органів, шкіри, мозку та рідин тіла для діагностики давності настання смерті та тілесних ушкоджень [3-6].

Встановити можливості діагностики гострих крововтрат із використанням методу лазерної автофлуоресцентної мікроскопії гістологічних зрізів прямого м'яза живота (ПМЖ).

### Матеріали і методи дослідження

Залежно від рівня крововтрати (V) розглядалися зразки гістологічних зрізів прямого м'яза живота з різним ступенем крововтрати. V=0мм<sup>3</sup>- група 1 - контрольна (35 зразків), а також наступні дослідні групи: V=500мм<sup>3</sup>± 100мм<sup>3</sup>- група 2 (20 зразків); V=1000мм<sup>3</sup>± 100мм<sup>3</sup> - група 3 (18 зразків); V=1500мм<sup>3</sup>± 100мм<sup>3</sup> - група 4 (21 зразок); V=2000мм<sup>3</sup>± 100мм<sup>3</sup> - група 5 (17 зразків); V=2500мм<sup>3</sup>± 100мм<sup>3</sup> - група 6 (16 зразків).

На рис. 1 представлена функціональна блок-схема спектрально-селективної лазерної автофлуоресцентної мікроскопії гістологічних зрізів структурованих біологічних тканин (БТ).

### Мета роботи




Рисунок 1. Функціональна блок-схема багатопараметричної спектрально-селективної лазерної автофлуоресцентної мікроскопії: 1- блок освітлення; 2- об'єктний блок; 3- проєкційний блок; 4- блок спектральної фільтрації; 5- блок фотоелектронної реєстрації; 6- блок обробки даних

Тут:

1 - блок освітлення БО біологічних препаратів, який забезпечує формування паралельного з діаметром 2 мм поляризованого лазерного пучка з довжиною хвилі 0,405 мкм, який збуджує власну флуоресценцію флуорофорів БТ;

2 - об'єктний блок ОБ - мікроскопічний столик з двохкоординатним переміщенням, на якому закріплюється біологічний препарат (БП);

3 - проєкційний блок ПБ, який за допомогою мікрооб'єктива МО (4X) забезпечує формування збудженого лазерним пучком автофлуоресцентного мікроскопічного зображення БП в площині цифрової камери;

4 - блок спектральної фільтрації БФ, який включає інтерференційні світлофільтри Ф для спектральної селекції збудженого автофлуоресцентного поліхроматичного випромінювання ансамблю флуорофорів БП;

5 - блок фотоелектронної реєстрації БФР мікроскопічних флуоресцентних зображень БП, який містить ЦК та забезпечує формування координатного цифрового розподілу величини інтенсивності в інтерфейсі комп'ютера;


6 - блок обробки даних БОД, який за допомогою персонального комп'ютера ПК забезпечує розрахунок величини статистичних моментів 1- 4-го порядків, які характеризують розподіли інтенсивності спектрально-селективної автофлуоресценції БП.

### Результати та їх обговорення

На рис. 2 приведені результати лазерної автофлуоресцентної мікроскопії (фрагменти (1),(3)) і гістограми (фрагменти (2),(4)) розподілів величини інтенсивності флуоресценції полікристалічних фібрилярних мереж гістологічних зрізів ПМЖ померлих з групи 1 (фрагменти (1),(2)) і групи 3 (фрагменти (3),(4)). Одержані результати лазерної автофлуоресцентної мікроскопії ілюструють наявність відмінностей між координатними

розподілами інтенсивності мап лазерної автофлуоресценції (МЛА) гістологічних зрізів ПМЖ померлих з різним ступенем крововтрати.

Установлено, що гістограми розподілів величини інтенсивності МЛА (рис.2, фрагмент 4) гістологічних зрізів тканини ПМЖ з рівнем крововтрати ( $V=1000\text{мм}^3 \pm 100\text{мм}^3$ ) характеризуються меншим середнім значенням і діапазоном розкиду випадкових значень інтенсивності флуоресценції порівняно з аналогічними розпо-



**Рисунок 2. Мапи (1,3) і гістограми (2,4) розподілів величини інтенсивності лазерної автофлуоресценції гістологічних зрізів прямого м'яза живота контрольної (1, 2) та дослідної (3,4) груп померлих**

ділами МЛА, які визначені для зразків аналогічної тканини померлого без крововтрати (рис. 2, фрагмент (2)). Виявлений факт різної інтенсивності лазерної автофлуоресценції зразків ПМЖ можна пояснити із залученням даних спектрально-селективної флуоресцентної мікроскопії гістологічних зрізів біологічних тканин різних органів людини [6-8]. Тут показано, що головним чинником формування координатної структури МЛА є концентрація формених елементів крові. Величина інтенсивності МЛА прямо пропорційна концентрації таких оптично анізотропних молекулярних структур гістологічного зрізу ПМЖ (рис. 2, фрагменти 1,3). Тому із збільшенням ступеня крововтрати (зменшенням концентрації формених елементів крові) знижується рівень інтенсивності лазерної авто флуоресценції [6-8]. У межах статистичного підходу до флуоресцентного аналізу зростання крововтрати супроводжується протилежними тенденціями - зменшенням середнього і дисперсії, які характеризують розподіли інтенсивності МЛА (рис. 2, фрагменти 2,4). Навпаки, асиметрія та ексцес розподілів випадкових значень інтенсивності лазерної автофлуоресценції зразків ПМЖ померлих зростають.

Кількісно цей сценарій зміни розподілів величини інтенсивності лазерної автофлуоресценції оптично анізотропних фібрилярних мереж сукупності зразків

гістологічних зрізів тканини ПМЖ померлих з різним ступенем крововтрати ілюструють статистичні моменти 1-4-го порядків, величини яких систематизовані в таблиці.

Установлено:

- діапазон зміни величини статистичних моментів 1-4-го порядків, які характеризують розподіли величини інтенсивності МЛА гістологічних зрізів ПМЖ, за рівнем крововтрати становить  $0\text{мм}^3 \div 2500\text{мм}^3$ ;

- величина статистичного моменту 1-го порядку  $SM_1$  змінюється у межах діапазону зміни середніх значень від 0,31 до 0,105;

- величина статистичного моменту 2-го порядку  $SM_2$  змінюється у межах діапазону зміни середніх значень від 0,27 до 0,04;

- величина статистичного моменту 3-го порядку  $SM_3$  змінюється у межах діапазону зміни середніх значень від 0,85 до 1,49;

- величина статистичного моменту 4-го порядку  $SM_4$  змінюється у межах діапазону зміни середніх значень від 0,45 до 1,74.

Залежності, що наведені на рис. 3, кількісно ілюструють діаграми динаміки зміни набору статистичних моментів  $SM_{1,2,3,4}$ , які характеризують розподіли величини інтенсивності МЛА зразків гістологічних зрізів

Статистична структура мап інтенсивності автофлуоресценції гістологічних зрізів ПМЖ померлих з різним ступенем крововтрати

Крововтрата, мм <sup>3</sup>	0	500мм <sup>3</sup> ± 100мм <sup>3</sup>	1000мм <sup>3</sup> ± 100мм <sup>3</sup>
Середнє, SM <sub>1</sub>	0.31 ± 0.013	0.27 ± 0.011	0.23 ± 0.001
Критерії, t, p	p < 0.05	p < 0.05	p < 0.05
Дисперсія, SM <sub>2</sub>	0.27 ± 0.011	0.21 ± 0.001	0.16 ± 0.0006
Критерії, t, p	p < 0.05	p < 0.05	p < 0.05
Асиметрія, SM <sub>3</sub>	0.85 ± 0.041	0.97 ± 0.044	1.09 ± 0.048
Критерії, t, p	p < 0.05	p < 0.05	p < 0.05
Експес, SM <sub>4</sub>	0.45 ± 0.021	0.71 ± 0.034	0.97 ± 0.043
Критерії, t, p	p < 0.05	p < 0.05	p < 0.05
Крововтрата, мм <sup>3</sup>	1500мм <sup>3</sup> ± 100мм <sup>3</sup>	2000мм <sup>3</sup> ± 100мм <sup>3</sup>	2500мм <sup>3</sup> ± 100мм <sup>3</sup>
Середнє, SM <sub>1</sub>	0.18 ± 0.008	0.14 ± 0.006	0.105 ± 0.004
Критерії, t, p	p < 0.05	p < 0.05	p < 0.05
Дисперсія, SM <sub>2</sub>	0.105 ± 0.004	0.08 ± 0.300	0.04 ± 0.002
Критерії, t, p	p < 0.05	p < 0.05	p < 0.05
Асиметрія, SM <sub>3</sub>	1.22 ± 0.051	1.34 ± 0.055	1.49 ± 0.058
Критерії, t, p	p < 0.05	p < 0.05	p < 0.05
Експес, SM <sub>4</sub>	1.26 ± 0.053	1.48 ± 0.048	1.74 ± 0.077
Критерії, t, p	p < 0.05	p < 0.05	p < 0.05




Рисунок 3. Залежності величини середнього (SM1), дисперсії (SM2), асиметрії (SM3) та експесу (SM4), які характеризують мапи інтенсивності автофлуоресценції гістологічних зрізів прямого м'язу живота померлих з різним ступенем крововтрати

ПМЖ усіх груп померлих.

**Висновки**

З одержаних даних про динаміку та сценарій зміни статистичних параметрів розподілів величини інтенсивності МЛА (рис. 3) видно, що значення статистичних параметрів - середнього (1), дисперсії (2), асиметрії (3) та експесу (4), які характеризують ступінь деполяризації лазерного випромінювання гістологічними зрізами ПМЖ померлих, змінюються у межах об'єму крововтрати 0мм<sup>3</sup> ± 2500 мм<sup>3</sup>. Чутливим до змін інтенсивності

лазерної автофлуоресценції зразків ПМЖ померлих з різним ступенем крововтрати виявився весь набір статистичних моментів 1-го - 4-го порядків.

**Перспективи подальших досліджень**

Отримані результати підтверджують можливість використання вказаного методу для дослідження гістологічних зрізів ПМЖ померлих внаслідок гострої крововтрати та у перспективі відкриває можливості дослідження інших біологічних тканини з фібрилярною структурою та різним ступенем крововтрати.

**Список літератури**

1. Ушенко ОГ, Бачинський ВТ, редактори. Основи лазерної поляриметрії: Чернівці; 2010. Частина 2, Патоморфологічні зміни біологічних тканин; 372 с.
2. Ushenko YuA, Syvokorovska AV, Gorsky MP, Tomka YuA, Sokolnuik SO, Bakun O, et al. System of 3D Mueller-matrix reconstruction of fibrillar networks of biological tissues of various morphological structure and physiological state. Proc SPIE. 2018;10728:107280R doi: <https://doi.org/10.1117/12.2320535>
3. Ushenko AG, Dubolazov AV, Ushenko VA, Ushenko YUA, Sakhnovskiy MYu, Balazyuk VN, et al. Polarization-correlation optical microscopy of anisotropic biological layers. Proc SPIE. 2016;9971:99712C. doi: <https://doi.org/10.1117/12.2237926>
4. Garazdyuk MS, Bachinskyi VT, Vanchulyak OY, Ushenko AG, Dubolazov OV, Gorsky MP. Polarization-phase images of liquor polycrystalline films in determining time of death. Appl Opt. 2016;55(12):B67-71. doi: 10.1364/AO.55.000B67
5. Ushenko YuO; Dubolazov OV, Ushenko VO; Zhytaryuk VG, Prydiy OG; Pavlyukovich N, et al. Statistical analysis of polarization interference images of biological fluids polycrystalline films in the tasks of optical anisotropy weak changes differentiation. Proc SPIE. 2018;10612: 106121Q. doi:10.1117/12.2305361
6. Ushenko AG, Pishak VP. Laser Polarimetry of Biological Tissues: Principles and Applications. In: Tuchin VV, editors. Coherent-Domain Optical Methods. Biomedical Diagnostics, Environmental and Material Science. Vol 1. Boston: Kluwer Academic Publishers; 2004, p. 93-136.
7. Angelsky OV, Ushenko AG, Ushenko YuA, Pishak VP, Peresunko AP. Statistical, Correlation and Topological Approaches in Diagnostics of the Structure and Physiological State of Birefringent Biological Tissues. In: Tuchin VV, editors. Handbook of Photonics for Biomedical Science. 1 ed. CRC Press; 2010, p. 283-322.
8. Ushenko YA, Boychuk TM, Bachynsky VT, Mincer OP. Diagnostics of Structure and Physiological State of Birefringent Biological Tissues: Statistical, Correlation and Topological Approaches. In: Tuchin VV, editors. Coherent-Domain Optical Methods. Biomedical Diagnostics, Environmental and Material Science. 2nd ed. New York: Springer; 2013, p. 107-48.

**Відомості про автора:**

Сивокоровська А-В. С. - аспірант кафедри судової медицини та медичного правознавства ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет", Чернівці; лікар судово-медичний експерт КМУ "Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи"

**Информация об авторах:**

Сивокоровська А-В. С. - аспірант кафедри судової медицини та медичного правознавства ВГУЗ України "Буковинський державний медичний університет", Чернівці; лікар судово-медичний експерт КМУ "Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи"

**Information about authors:**

Sivokorovska AV. S. - Postgraduate Student, Department of Forensic Medicine and Medical Law, Higher State Educational Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University", Chernivtsi

**References**

1. Ushenko OH, Bachyn'skyi VT, redaktory. Osnovy lazernoї poliarymetrii: Chernivtsi; 2010. Chastyna 2, Patomorfologichni zminy biolohichnykh tkanyn [Pathomorphological changes in biological tissues]; 372 p. . (in Ukrainian).
2. Ushenko YuA, Syvokorovska AV, Gorsky MP, Tomka YuA, Sokolnuik SO, Bakun O, et al. System of 3D Mueller-matrix reconstruction of fibrillar networks of biological tissues of various morphological structure and physiological state. Proc SPIE. 2018;10728:107280R doi: <https://doi.org/10.1117/12.2320535>
3. Ushenko AG, Dubolazov AV, Ushenko VA, Ushenko YUA, Sakhnovskiy MYu, Balazyuk VN, et al. Polarization-correlation optical microscopy of anisotropic biological layers. Proc SPIE. 2016;9971:99712C. doi: <https://doi.org/10.1117/12.2237926>
4. Garazdyuk MS, Bachinskyi VT, Vanchulyak OY, Ushenko AG, Dubolazov OV, Gorsky MP. Polarization-phase images of liquor polycrystalline films in determining time of death. Appl Opt. 2016;55(12):B67-71. doi: 10.1364/AO.55.000B67
5. Ushenko YuO; Dubolazov OV, Ushenko VO; Zhytaryuk VG, Prydiy OG; Pavlyukovich N, et al. Statistical analysis of polarization interference images of biological fluids polycrystalline films in the tasks of optical anisotropy weak changes differentiation. Proc SPIE. 2018;10612: 106121Q. doi:10.1117/12.2305361
6. Ushenko AG, Pishak VP. Laser Polarimetry of Biological Tissues: Principles and Applications. In: Tuchin VV, editors. Coherent-Domain Optical Methods. Biomedical Diagnostics, Environmental and Material Science. Vol 1. Boston: Kluwer Academic Publishers; 2004, p. 93-136.
7. Angelsky OV, Ushenko AG, Ushenko YuA, Pishak VP, Peresunko AP. Statistical, Correlation and Topological Approaches in Diagnostics of the Structure and Physiological State of Birefringent Biological Tissues. In: Tuchin VV, editors. Handbook of Photonics for Biomedical Science. 1 ed. CRC Press; 2010, p. 283-322.
8. Ushenko YA, Boychuk TM, Bachynsky VT, Mincer OP. Diagnostics of Structure and Physiological State of Birefringent Biological Tissues: Statistical, Correlation and Topological Approaches. In: Tuchin VV, editors. Coherent-Domain Optical Methods. Biomedical Diagnostics, Environmental and Material Science. 2nd ed. New York: Springer; 2013, p. 107-48.

Стаття надійшла до редакції 20.03.2019

Рецензент – проф. В.Т. Бачинський

© А-В. С. Сивокоровська, 2019