

215. ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА СПАЙКОВОГО ПРОЦЕСУ У ЖІНОК З НЕПЛІДДЯМ ТРУБНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Приймак С.Г., Стратан К.П.

м. Чернівці, Україна

Буковинська державна медична академія

Ефективність відновлення репродуктивної функції у жінок з трубним непліддям залежить від якості реабілітаційної терапії, яка спрямована на попередження утворення злук та реоклюзії маткових труб, а також забезпечує відновлення функції маткових труб у післяопераційному періоді.

Під нашим спостереженням перебувало 130 жінок з непліддям трубного походження, яким були проведені лапароскопічні реконструктивно-пластичні операції. Для проведення реабілітаційних заходів пацієнтки були розділені на 2 групи: перша одержувала традиційний загальноприйнятий комплекс реабілітаційних заходів, друга – запропонований нами спосіб реабілітаційної терапії, який включав 3 етапа: I - проведення інтра- та післяопераційно гідротубацій 0,01% розчином мірамістину, системної ензимотерапії препаратом вобензиму, УФО крові; II - проведення контрольованого зачаття в перші місяці після операції; III - санаторно-курортне лікування.

Завдяки проведенню комплексної поетапної відновної терапії нам вдалося відновити прохідність маткових труб у 76% жінок та домогтися настання вагітності у 22,2%, тобто в кожній 5-ї жінки.

Як свідчать отримані дані, застосований нами комплекс реабілітаційних заходів підвищує ефективність лапароскопічних реконструктивно-пластичних операцій при БТП з трубною оклюзією II ступеня в 1,6 разу та спайковим процесом I стадії в 1,8 разу.

Це свідчить про достатньо високу ефективність запропонованого комплексу реабілітаційних заходів у пацієнток з помірною оклюзією маткових труб.