




# ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

1(79) 2015

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ



- Криптококовий менінгіт
- Герпетичні інфекції
- Кір
- Токсоплазмоз
- Туберкульоз
- Бактеріофаги
- Лептоспіроз

ISSN 1681-2727



9 771681 272000

# ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

Головний редактор **М.А. Андрейчин**

*Н.А. Васильєва,  
Ж.І. Возіанова,  
К.С. Волков,  
О.П. Волосовець,  
В. Гальота,  
В.І. Задорожна,  
О.Л. Івахів,  
С.І. Климнюк (заступник головного редактора),  
І.М. Кліщ,  
В.С. Копча (відповідальний секретар),  
М.М. Корда,  
Л.Т. Котляренко,  
С.О. Крамарьов,  
Ю.І. Кундієв,  
В.Ф. Марієвський,  
М.Д. Чемич,  
Ю.І. Фещенко.*

*І.В. Богадельніков (Сімферополь),  
Н.О. Виноград (Львів),  
Б.А. Герасун (Львів),  
О.А. Голубовська (Київ),  
О.В. Деміховська (Росток, Німеччина),  
Б.М. Дикий (Івано-Франківськ),  
Г.М. Дубинська (Полтава),  
О.К. Дуда (Київ),  
О.М. Зінчук (Львів),  
І.З. Карімов (Сімферополь),  
І.О. Карпов (Мінськ, Білорусь),  
В.М. Козько (Харків),  
І.П. Колеснікова (Київ),  
А. Лайшконіс (Каунас, Литва),  
В.П. Малий (Харків),  
С. Маріна (Софія, Болгарія),  
Л.В. Мороз (Вінниця),  
В.Д. Москалюк (Чернівці),  
Е.І. Мусабаєв (Ташкент, Узбекистан),  
І.І. Незгода (Вінниця),  
К.С. Плочев (Софія, Болгарія),  
А.О. Руденко (Київ),  
О.В. Рябоконт (Запоріжжя),  
К.Л. Сервецький (Одеса),  
М.С. Суремченко (Дніпропетровськ),  
Л.А. Ходак (Харків),  
В.Р. Шахгільдян (Київ),  
В.П. Широбоков (Київ),  
А.М. Щербінська (Київ),  
О.О. Ярош (Київ).*

Всеукраїнський науково-практичний  
медичний журнал

Заснований у листопаді 1994 року  
Виходить з 1995 року щоквартально

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 16795-5367 Р, видане Міністерством юстиції України 10.06.2010 р.

Відповідно до постанови президії ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4 журнал «Інфекційні хвороби» повторно внесений до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі медицини

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз Google Scholar та Index Copernicus

## АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

Журнал «Інфекційні хвороби».  
Медуніверситет.  
Майдан Волі, 1  
м. Тернопіль, 46001, УКРАЇНА  
Тел.: (0352) 52-47-25.  
E-mail: infecdis@ukr.net

Розповсюдження журналу  
за передплатою.

**Одержуван платежу** Тернопільський державний медичний університет;  
**код** 02010830;  
**р/р** 31252273210444 в  
**ГУДКСУ** в Тернопільській обл.;  
**МФО** 838012.

Видання журналу рекомендоване вченою радою Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського (протокол № 8 від 23.12.2014 р.).

Дизайн, верстка Ярослава Теслюк

Підписано до друку 24.12.2014 р.

Видавець і виготівник:  
ТДМУ імені І.Я. Горбачевського  
Майдан Волі, 1  
м. Тернопіль, 46001, УКРАЇНА

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи  
ДК № 2215 від 16.06.2005 р.

За зміст рекламних матеріалів відповідальність несе рекламодавець. При передруці або відтворенні повністю чи частково матеріалів журналу «ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ» посилання на журнал обов'язкове.

**Х.І. Возна, В.Д. Москалюк**

## **ЕНДОТЕЛІЙ: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЙОГО ДИСФУНКЦІЯ**

Буковинський державний медичний університет

*Наведено сучасні відомості про фізіологію ендотелію та патогенез ендотеліальної дисфункції. Особлива увага приділена взаємозалежним впливам багатьох вазоактивних субстанцій ендотеліального походження, передусім оксиду азоту (NO) та ендотелінів. Попри загально визнане значення дисфункції ендотелію при кардіоваскулярній і церебральній патології, значна увага приділена ролі цього явища при ряді інших соматичних та інфекційних недуг, зокрема при ВІЛ-інфекції/СНІДі.*

**Ключові слова:** ендотелій, ендотеліальна дисфункція, кардіоваскулярна патологія, ВІЛ-інфекція/СНІД.

Завдяки інтенсивним і різнобічним дослідженням сьогодні стало очевидно, що ендотелій є складною метаболічною системою й активно функціонуючим органом, що регулює багато фізіологічних процесів [1, 2]. Регуляторні функції ендотелію здійснюються завдяки його активній синтетичній ролі.

В ендотелі мікроциркуляторного русла переважає обмінна, а магістральних судин – метаболічна і синтетична функції. Метаболічна функція ендотелію включає, крім синтезу речовин, захоплення й інактивацію деяких субстанцій, циркулюючих у крові (ацетилхолін, гістамін, брадикінін, катехоламіни та ін.) [3]. Крім цього ендотелій забезпечує безперервний обмін речовин між тканинами і кровотоком, синтезує речовини базально мембрани [4].

Речовини, що продукуються ендотелієм, можна розділити на групи за різноманітними ознаками. У роботі Кужелово М. та ін. [3] субстанції ендотеліального походження згруповані за величиною молекулярно маси: 1) з низькою молекулярною масою: оксид азоту, простагліцилін, аденозин, ендотелін, тромбоксан  $A_2$  –  $TXA_2$ , простагландин  $H_2$ , тромбоцитарноактивуючий фактор (PAF); 2) з високою молекулярною масою: інтерлейкін-1, гормони росту – фактор росту тромбоцитів (PDGF); 3) з високою молекулярною масою: фактори гемостазу і фібринолітично системи.

З другого боку, в роботі Малахова В.А. [5] ендотеліальні фактори класифіковані за функціональними особливостями: вазоконстриктори; вазодилататори; речовини, що впливають на гемостаз і фібриноліз.

За швидкістю утворення в ендотелі різні біологічно активні речовини можна розділити на такі групи [6]: 1) речовини, що постійно утворюються в ендотелі (NO, простагліцилін); 2) речовини, що накопичуються в ендотелі і виділяються з нього при його стимуляції, активації або пошкодженні (фактор Віллебранда, тканинний активатор плазміногену та ін.); 3) речовини, які у фізіологічних умовах практично не утворюються, проте їх синтез різко збільшується при активації/пошкодженні ендотелію (ендотелін-1, ICAM-1, VCAM-1, E-селектин); 4) речовини, що є рецепторами ендотелію (тромбомодулін, рецептор протеїну С).

У роботі Мало Л.Т. та ін. [7] наведена найбільш містка й повна класифікація ендотеліальних факторів: 1) вазоактивні субстанції (дилататори і констриктори); 2) фактори росту (промоутери й інгібітори росту); 3) медіатори запалення (молекули адгезії й антигени); 4) гемостатичні і тромботичні фактори (протиангіагреганти).

Найважливішою з функцій ендотелію визнається регуляція судинного тонуусу. Ще Furchgott і Zawadzki виявили, що розслаблення судин після додавання ацетилхоліну відбувається внаслідок вивільнення ендотелієм ендотеліального фактору релаксації (ЕФР – EDRF – endothelium derived relaxing factor), і активність цього процесу залежить від цілісності ендотеліально вистилки [1, 8]. Новим проривом у вивченні ендотелію було встановлення рядом вчених [9, 10] хімічно природи ЕФР – оксиду азоту. При цьому виявили, що більшість вазорегулюючих речовин діють на судинну стінку за допомогою універсального механізму – синтезу ендотелієм NO. Оксид азоту, що утворюється з L-аргініну при участі ферменту NO-синтази, активує в гладком'язових клітинах гуанілатциклазу, стимулюючи синтез циклічного гуанозинмонофосфату (ц-ГМФ) [10]. Циклічний гуанозинмоно-

фосфат є основним внутрішньоклітинним месенджером у серцево-судинній системі й обумовлює розслаблення судин, гальмування активності тромбоцитів і макрофагів [11]. Ефекти оксиду азоту залежать від його концентрації, місця продукції, ступеня дифузії крізь судинну стінку, генерації речовин з наявністю оксиду азоту, здатності взаємодіяти з кисневими радикалами, рівня інактивації [12]. Існує 2 рівні секреції оксиду азоту: 1) базальна секреція NO у фізіологічних умовах підтримує тонус судин у спокої і забезпечує неадгезивність ендотелію щодо формених елементів крові [4]; 2) стимульована секреція NO (як стимули виступають ацетилхолін, брадикінін, гіпоксія, механічна деформація, напруга зрушення) забезпечує вазодилатацію у відповідь на приплив крові [1, 13].

У ході глибокого вивчення природи NO-синтази (NOS) виявлені 3 типи [14]. NOS 1-го типу – нейрональна (за локалізацією першого виявлення), експресується в нервовій тканині, скелетних м'язах, кардіоміоцитах, епітелі бронхів і трахеї [15]. Це конституціональний фермент, що модулюється внутрішньоклітинним рівнем іонів кальцію і бере участь у механізмах пам'яті, координації між нервовою активністю та судинним тонусом, реалізації болювого подразнення [16]. NOS 2-го типу локалізована в ендотеліоцитах, кардіоміоцитах, гладком'язових клітинах, гепатоцитах, але основне джерело – макрофаги [15]. Це індукцибельна форма NOS, не залежна від внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію, наслідком активації якої є гіперпродукція оксиду азоту аж до цитотоксичних рівнів. В індукції цього типу ферменту беруть участь прозапальні цитокіни, ендотоксини [17]. Третій тип NOS – ендотеліальний фермент (за місцем первинного виявлення), це конституціональний мембранозв'язаний фермент, що регулюється вмістом кальцію. При активації цього ферменту [15] в ендотелі синтезуються фізіологічні рівні оксиду азоту, що забезпечують релаксацію гладких міоцитів. Вважається, що порушення синтезу фізіологічних концентрацій оксиду азоту відіграє найважливішу роль у механізмах ініціації і прогресу ендотеліальної дисфункції [18]. Вазопротекторні функції NO, крім участі у вазорегуляції, полягають у модуляції вивільнення вазоактивних медіаторів, пригніченні адгезії лейкоцитів до судинної стінки. Це відбувається за допомогою інгібіції експресії молекул адгезії VCAM-1, ICAM-1, E-селектину, зниження стабільності м-РНК моноцитарного хемотаксисного фактору, тобто оксид азоту перешкоджає прилипанню, а потім і проникненню в судинну стінку лейкоцитів. Механізми антипроліферативної дії NO припускають його участь в ремоделюванні судинної стінки

шляхом пригнічення мітогенезу і проліферації гладком'язових клітин і фібробластів [19]. Крім цього, NO пригнічує експресію прозапальних генів судинної стінки, зокрема транскрипційного фактору NF- $\kappa$ B. Важлива участь NO в пригніченні активації, секреторних функцій, адгезії й агрегації тромбоцитів шляхом підвищення в них рівня ц-ГМФ [1, 20].

До судинорозширювальних субстанцій, крім NO, належать простагліцині, ендотеліальний фактор гіперполяризації, натрійуретичний С-пептид, аденомодулін [7]. Простагліцин ( $PGI_2$ ), що продукується в ендотелі, медіє адгезію судин при дії напруги зрушення, гіпоксії, деяких медіаторів, через механізм активації циклічного аденозинмонофосфату (ц-АМФ) розслабляє гладкі м'язи медіє. Простагліцин належить до найбільш ефективних природних інгібіторів агрегації тромбоцитів, але не впливає на їх адгезію [21].

Баланс у системі вазорегуляції забезпечується, крім вазодилаторів, активним функціонуванням констрикторних агентів. З цих позицій підкреслюється перспективність вивчення ендотелінів і модуляторів їх активності [22].

Поліпептидна природа і структура ендотеліну-1 вивчена колективом дослідників у 1988 р. [23]. Різноманіття ендотелінопосередкованих ефектів деякою мірою обумовлене поліморфізмом самого ендотеліну і його локалізацією. Виділені 3 ізоформи ендотеліну й уточнені джерела їх синтезу: ендотелін-1 виробляється головним чином в ендотелі і гладком'язових клітинах судин, меншою мірою – нейронами і клітинами деяких внутрішніх органів; джерела ендотеліну-2 – нирки, кишечник, міокард, плацента і матка, а ендотеліну-3 – головний мозок, травний канал, легені та нирки. У низьких концентраціях ендотелін-1 забезпечує вазодилатаційний ефект, а у високих – вазоконстрикцію артерій і вен шляхом активації  $Ca^{2+}$ -каналів, спричиняє проліферацію гладких міоцитів і фібробластів судинної стінки, бере участь у процесі програмованої клітинної загибелі – апоптозі, забезпечує експресію адгезивних молекул [24].

Фізіологічним антагоністом синтезу ендотеліну-1 є оксид азоту, з другого боку, відсутність вазоконстрикторного ефекту ендотеліну-1 є стимулюючим фактором продукції NO. У ряді досліджень вивчені корелятивні зв'язки між ендотеліном-1 і маркерами метаболізму оксиду азоту (нітрит/нітрати): у здорових осіб не було кореляції між цими показниками, навпаки, між рівнем артеріального тиску, периферичним судинним опором і значеннями ендотеліну-1 в плазмі крові відмічений позитивний зв'язок [25].

У нормально функціонуючому ендотелі переважає вивільнення вазорелаксуючих речовин. Проте в

## ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІ

певних кровоносних судинах (периферичні вени і великі церебральні артерії) нормальний ендотелій схильний до продукції судинозвужувальних речовин, зокрема супероксиду аніону й тромбоксану  $A_2$ .

Здоровий ендотелій підтримує інтактною люмінальну поверхню і регулює антикоагулянтні, фібринолітичні та антитромботичні механізми [26]. Антитромботичні ефекти ендотелію виражаються в пригніченні адгезії та агрегації тромбоцитів оксидом азоту і простагліцином [1, 27].

Різноманітні механізми взаємодії ендотеліальних та імунотропних клітин. Так, ендотеліальна стінка розглядається як ланка імунологічних реакцій при ряді аутоімунних і запальних захворювань, що лежить в основі гіперчутливості сповільненого типу, відторгнення трансплантату, формування імунно відповіді на вірусні, бактерійні та паразитарні агенти. При розвитку імунного запалення ендотелій стає однією з мішеней дії цитокінів (інтерлейкін-1, фактор некрозу пухлин, трансформуючий фактор росту), в той же час ендотеліальні клітини активно беруть участь і в продукції ряду цитокінів (інтерлейкін-1, інтерлейкін-6), виконуючи імунорегуляторну функцію. Медіаторне пошкодження ендотелію може призводити до його дисфункції, оголення або фокального клітинного некрозу [4].

Вивчення стану ендотелію судин при різноманітних патологічних процесах віднедавна стало звичним явищем у наукових дослідженнях [28]. Передусім було встановлено, що порушення функціонального стану ендотелію, зокрема активація та проліферація ендотеліальних клітин, цитокінова реакція та утворення інших прозапальних медіаторів, відіграє важливу роль при багатьох серцево-судинних захворюваннях (ішемічній хворобі серця, ішемічному інсульті), системних хронічних захворюваннях, що супроводжуються ангіопатією (цукровому діабеті, гіпертонічній хворобі), системному ендотоксикозі (гестозі) та ін. Результати експериментальних і клінічних досліджень останніх років підтвердили теорію про важливий причинно-наслідковий зв'язок між виникненням і/або прогресуванням атеросклерозу та функціональним станом ендотелію [29].

Доведена активна участь ендотелію в різноманітних процесах у фізіологічних умовах і при різних патологічних станах: ендотеліоцити беруть безпосередню участь у вазорегуляції за допомогою продукції факторів вазодилатації і вазоконстрикції, імунопатологічних та оксидантних реакціях. Переважне порушення тієї або іншої функції ендотелію залежить від локалізації патологічних процесів, переважання тих чи інших медіаторів запалення, наявності гемодина-

мічних порушень. Результати сучасних досліджень дозволяють вважати, що ендотеліальна дисфункція – один з найважливіших незалежних факторів ризику при діабеті, атеросклерозі, гіпертонії, сепсисі, злоякісних захворюваннях.

Дослідження ендотеліальної дисфункції, під якою розуміють дисбаланс у системі продукції і функціонування численних судинних факторів з порушенням гомеостазу судинної стінки, знайшло віддзеркалення у великій кількості робіт в галузі кардіології [7]. Це дозволило поглянути на патогенез і корекцію серцево-судинної патології з інших позицій.

Дисфункція ендотелію може бути самостійною причиною порушення кровообігу в органі, оскільки нерідко провокує ангіоспазм або тромбоз судин, зокрема, спостерігається при ішемічній хворобі серця. З другого боку, порушення регіонарного кровообігу (венозний застій, ішемія) також можуть призводити до дисфункції ендотелію [30].

Показаний розвиток ендотеліальної дисфункції при гострому коронарному синдромі. При цьому виявлений дисбаланс між ендотеліальними вазодилаторами і вазоконстрикторами у бік останніх і його зв'язок з підвищеним вмістом цитокінів (фактор некрозу пухлин  $\alpha$ , інтерлейкіни), що свідчить про медіаторне пошкодження судинного ендотелію при розвитку гостро коронарної судинної реакції.

При дії різних несприятливих факторів ендотеліальна дисфункція проходить декілька фаз [1, 31]: 1) підвищена секреторна активність ендотеліоцитів – фаза компенсації (зворотна) в умовах зростаючих вимог до судинної системи; 2) порушення балансу ендотеліальної секреції – проміжна фаза (зворотна) порушення в системі продукції та інактивації, ускладнення співвідношень ендотеліальних факторів призводять до порушення власної бар'єрної функції ендотелію, підвищується його проникність для моноцитів, прозапальних цитокінів, ендотеліну-1 та ін.; 3) структурно-метаболічне виснаження ендотелію – функціональне згасання, загибель і десквамація клітин, пригнічення х регенерації – фаза декомпенсації (незворотна).

Стрес, куріння, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія здатні спричинити дисбаланс синтезу та інактивації ендотеліозалежних факторів зі зрушенням у бік прокоагуляційної ланки.

Збільшення частоти захворювань системи кровообігу з віком корелює зі зниженням рівня оксиду азоту, простагліцину, зростанням вмісту ендотеліну-1 і тромбоксану  $A_2$  у плазмі крові. Це відбувається разом з вікозалежними порушеннями судинорухово, антитромботично і протизапально (підвищення рівня

прозапального цитокіну – фактору некрозу пухлин- $\alpha$ ) функцій ендотелію.

Таким чином, узагальнюючи ці дослідження механізму дії ендотеліальних факторів на судинний тонус, можна відзначити, що причинами скорочення ГМК судин при церебро- або кардіоваскулярній патології є підвищена генерація активних форм кисню (АФК), зміна активності NO-синтази, а також зниження синтезу NO або посилення його інактивації в умовах гіпоксії.

Структурно-функціональні зміни стінки судин при артеріальній гіпертензії, у тому числі х ремодельовання, ендотеліальна дисфункція, секреція вазоконстрикторів, порушують авторегуляцію мозкового кровоплину і підвищують вірогідність ішемічного пошкодження.

АФК у низьких концентраціях проявляють захисну дію (мікробіцидну та антибластомну), у високих – пошкоджують власні клітини організму шляхом інактивації ферментів, руйнування базальних і клітинних мембран, змінюють структуру ДНК, що призводить до руйнації ендотеліоцитів, тромбоцитів, нейронів, фібробластів та інших видів клітин.

Перекисне окислення ліпідів (ПОЛ) в біомембранах активує синтез індукторів агрегації тромбоцитів – ендоперекисів, а також простагландинів і тромбоксанів. Збільшення інтенсивності ПОЛ у плазмі крові й ендотелію призводить до пригнічення ферменту простагландинсинтази. У результаті знижується секреція ендотелієм простаглантину – потужного природного атромбогенного чинника [7].

Пошкоджені в процесі окислювального стресу білки здебільшого не відновлюються і підлягають утилізації протеолітичними системами, вже зміненими в ході окислювальних реакцій. Це сповільнює процеси утилізації, призводить до зростання вмісту окисляючих модифікованих протеїнів з прогресуючим порушенням клітинних функцій [24].

Інтенсивність вільнорадикального окислення визначається як швидкістю утворення ініціаторів вільнорадикального окислення – активних форм кисню, так і антиоксидантними можливостями захисних систем організму. При патологічних станах баланс у системі «активні форми кисню – антиоксидантна система» порушується [1].

Таким чином, ендотеліальна дисфункція – це передусім дисбаланс між продукцією вазодилатуючих, антипроліферативних, ангіопротекторних факторів (NO, простагландин, тканинний активатор плазміногену та ін.) і вазоконстрикторних, протромботичних, проліферативних, прозапальних субстанцій (ендотелін, тромбоксан  $A_2$ , супероксиданіон, інгібітор тка-

нинного активатора плазміногену, цитокіни та ін.). При цьому до кінця не ясним залишається питання первинності дисфункції ендотелію при кардіологічній патології та ряді інфекційних недуг, зокрема ВІЛ-інфекції /СНІДі. Очевидно, що фактори ризику судинних захворювань (вік, куріння, надлишкова вага, атерогенні дисліпідемії, гіпергомоцистеїнемія та ін.) рано чи пізно порушують баланс ендотеліальних судинних агентів, що врешті реалізується в ініціюванні та прогресі патологічних змін судин, у тому числі церебральних [1, 32, 33].

На сьогодні підтверджена участь судинного ендотелію в різних патологічних процесах, що призводять до ішемічно-гіпоксичних, мікроциркуляторних порушень: зміна секреції оксиду азоту та ендотеліну-1, зміна ендотеліозалежних механізмів вазорегуляції, активація окислювальних процесів, гемореологічні порушення, активація тромбоцитарної ланки гемостазу, ініціація проліферативних процесів гладком'язових клітин судин, пошкодження ендотеліоцитів. У зв'язку з цим набуває великого значення подальше вивчення тонких механізмів судинного патогенезу різноманітної інфекційної патології.

Так, нещодавно працівниками нашої кафедри було встановлено, що ВІЛ-інфекція/СНІД супроводжується дисфункцією ендотелію, про що свідчить істотне збільшення в сироватці крові хворих вмісту тромбомодуліну, Е-селектину і фактора Віллебранда. Виявлена зворотна кореляція між кількістю Т-хелперів і показниками ендотеліальної дисфункції [27].

Автори довели, що СНІД-асоційовані інфекції (хронічний гепатит С, хронічний гепатит В, туберкульоз легень, герпетичні інфекції, уrogenітальний хламідіоз та ін.) поглиблюють лейко-, лімфопенію, а також дисфункцію ендотелію, причому найбільший вплив на підвищення рівня тромбомодуліну, Е-селектину і фактора Віллебранда мають HBV і, особливо, HCV, інфікування якими супроводжують ВІЛ-інфекцію [28].

Відомо, що ендотеліальна дисфункція може бути обумовлена ВІЛ-інфекцією, імунною реакцією на вірус або ефектами протівірусної терапії. ВІЛ-інфекція може викликати функціональні порушення ендотелію, схожі із субклінічним запаленням при атеросклерозі [34]. У ВІЛ-інфікованих пацієнтів з низьким або середнім серцево-судинним ризиком і рівнями ліпідів у межах нормальних значень, проте, була виявлена ендотеліальна дисфункція, якої не було у здорових осіб контрольної групи [35].

Механізмів пошкодження ендотелію при ВІЛ-інфекції може бути декілька. Так, у світовій літературі є дані про безпосереднє інфікування ендотелію ВІЛом [36], хоча пряма цитопатична дія вірусу на ендотел-

## ОГЛЯДИ ТА ЛЕКЦІ

іоцити ще потребує підтвердження. Більш доведеною є схема ВІЛ-індукованого ураження ендотеліальних клітин через каскад запальних реакцій, що також є важливою ланкою в патогенезі ВІЛ-інфекції. Білки ВІЛу започатковують виділення прозапальних цитокінів, таких як інтерлейкін-8 (ІЛ-8), і спричиняють апоптоз ендотелію [37].

Відомо, що вірус імунодефіциту людини при попаданні в організм інфікує імунокомпетентні клітини, проникає в кров'яне русло і розповсюджується по організму. У міру розвитку інфекційного процесу в крові виявляють зміни рівня факторів, що відображають персистентну активацію ендотелію судин або пошкодження і впливають на функціонування системи коагуляції-антикоагуляції в кров'яному руслі. У крові ВІЛ-інфікованих осіб дослідники встановили збільшення вмісту фактора VIII фон Віллебранда, за допомогою якого здійснюється адгезія тромбоцитів на мембрані ендотеліальних клітин, що веде до тромбоутворення. При цьому кількість фактора Віллебранда корелює зі зменшенням числа CD4<sup>+</sup>-Т-лімфоцитів, рівнем β2-мікроглобуліну і вірусним навантаженням, тобто чинниками, що відображають патогенез захворювання [27]. Стан гіперкоагуляції крові у ВІЛ-інфікованих осіб пов'язаний також зі збільшенням вмісту в крові інгібітора активатора плазміногену, сприяючого тромбоутворенню, і зменшенням рівня антикоагулянтного S-білка [38]. У патогенезі захворювання значне зниження числа CD4<sup>+</sup>-лімфоцитів у крові супроводжувалося збільшенням вмісту розчинного тромбомодуліну, тобто відбувалося відщеплення від поверхні ЕК тромбомодуліну, наявність якого забезпечує антитромбогенні функції внутрішньо поверхні судин [27]. Збільшення вмісту у крові маркерів активації і пошкодження ендотеліальних клітин, представлених вище, мабуть, пов'язано з кисневим вибухом, оскільки антиоксидантна терапія хворих на СНІД приводила як до поліпшення клінічного перебігу захворювання, так і до зменшення цих показників [39]. Разом з тромбоутворенням у судинному руслі у невеликої частини ВІЛ-інфікованих пацієнтів з тромботичною тромбоцитопенічною пурпурою і рідкісною тромботичною мікроангіопатією дисфункція ендотелію виявлялася також локальною проліферацією мікросудинних ендотеліальних клітин за відсутності запального процесу [40]. При цьому сироватка крові таких хворих містила фактори, які при використанні *in vitro* через активацію Fas-ліганда викликали апоптоз ендотеліальних клітин [41].

Однак, попри інтенсивне дослідження ролі й механізму ендотеліально дисфункції при різних хворо-

бах, значення при ВІЛ-інфекції досі з'ясоване недостатньо.

### Література

1. Волошин П.В. Эндотелиальная дисфункция при цереброваскулярной патологии / П.В. Волошин, В.А. Малахов, А.Н. Завгородняя. – Харьков, 2006. – 92 с.
2. Ковалева О.Н. Патогенез и лечение тромбоцитарных нарушений в кардиологии / О.Н. Ковалева, Т.Н. Амбросова. – Харьков: Торнадо, 2013. – 80 с.
3. Современные сведения и функции сосудистого эндотелия / [М. Кужелова, С. Эделштайнова, О. Ядронева и др.] // Словакофарма ревю. – 2004. – Т. 4, № 2-3. – С. 55-59.
4. Lusher T.F. Biology of the endothelium / T.F. Lusher, M. Barton // Clin. Cardiology. – 2007. – Vol. 20. – P. 3-10.
5. Клеточно-мембранные аспекты патогенеза, лечения и профилактики хронических церебральных ишемий и нейродегенеративных процессов / В.А. Малахов, А.М. Белоус, И.Н. Пасюра, Г.И. Дорошенко. – Харьков: Ранок, 2009. – 172 с.
6. Inagami T. Endothelium as an endocrine organ / T. Inagami, M. Naruse, R. Hoover // Annu. Rev. Physiol. – 2005. – Vol. 57. – P. 171-189.
7. Малая Л.Т. Эндотелиальная дисфункция при патологии сердечно-сосудистой системы / Л.Т. Малая, А.Н. Корж, Л.Б. Балковая. – Харьков: Торсинг, 2000. – 432 с.
8. Furchgott R.F. The obligatory role of endothelial cells in the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine / R.F. Furchgott, J.V. Zawadzki // Annu. Rev. Physiol. – 2010. – Vol. 327. – P. 373-376.
9. Palmer R.M. Nitric oxide release accounts for the biological activity of endothelium-derived relaxing factor / R.M. Palmer, A.G. Ferrige, S. Moncada // Ibid. – 2007. – Vol. 288. – P. 524-526.
10. Ткаченко М.М. Оксид азота та судинна регуляція / М.М. Ткаченко // Теоретична медицина. – 2007. – Т. 3, № 2. – С. 241-254.
11. Лечение синдрома диабетической стопы: Методические рекомендации. – Луганск: Управление здравоохранения Луганской областной государственной администрации, Луганская ОКБ, 2003. – 32 с.
12. Беридзе М.З. Механизмы отсроченной гибели нейронов при острой церебральной ишемии в эксперименте / М.З. Беридзе, И.Т. Урушадзе, Р.Р. Шакаришвили // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Инсульт (приложение). – 2011. – № 3. – С. 35-40.
13. Michael T. Vasoprotection by nitric oxide: mechanisms and therapeutic potential / T. Michael, M. Gewaltig, G. Kojda // Cardiovascular research. – 2012. – Vol. 55. – P. 250-260.
14. Dysfunctional regulations of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) expression in response to exercise in mice lacking one eNOS gene / G. Kojda, Y.C. Cheng, J. Burchfield, D.G. Harrison // Circulation. – 2011. – Vol. 103. – P. 2839-2844.
15. Kazuhiro S. Expression and regulation of endothelial nitric oxide synthase / S. Kazuhiro, T. Michel // TCM. – 2007. – N 7 (1). – P. 28-37.
16. Snyder S.H. Biological roles of nitric oxide / S.H. Snyder, D.S. Bredt // Sci. Amer. – 2012. – Vol. 266. – P. 68-71.
17. Zhang H. Nitric oxide differential regulates induction of type II nitric oxide synthase in rat vascular smooth muscle cells versus macrophages / H. Zhang, C. Snead, D. John // Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. – 2011. – Vol. 21. – P. 529-535.

18. Cooke J.P. Role of nitric oxide in progression and regression of atherosclerosis / J.P. Cooke // *West J. Med.* – 2006. – Vol. 164. – P. 419-424.
19. Lauer T. Indexes of NO bioavailability in human blood / T. Lauer, P. Kleinbongard, M. Kelm // *News Physiol. Sci.* – 2012. – Vol. 17, N 12. – P. 251-255.
20. Bassenge E. Antiplatelet effects of endothelium-derived relaxing factor and nitric oxide donors / E. Bassenge // *Eur. Heart J.* – 2011. – Vol. 12 (Suppl. E). – P. 12-15.
21. Harrison D.G. Cellular and molecular mechanism of endothelial cell dysfunction / D.G. Harrison // *J. Clin. Investig.* – 2007. – N 100. – P. 2153-2157.
22. Ендотеліни та серцево-судинна патологія / З.О. Себровська, М.В. Белікова, М.М. Данилов, О.І. Плиська // *Укр. медичний часопис.* – 2010. – № 1 (15). – С. 102-106.
23. A novel potent vasoconstrictor peptide produced by vascular endothelial cells / [M. Yanagisawa, H. Kurihara, S. Kimura et al.] // *Nature.* – 1988. – Vol. 332. – P. 411-415.
24. Stefanec T. Endothelial apoptosis: could it have a role in the pathogenesis and treatment of disease? / T. Stefanec // *Chest.* – 2010. – Vol. 117. – P. 841-854.
25. Nitrogen oxide levels in patients after trauma and during sepsis / [J.B. Ochoa, A.O. Udekwo, T.R. Billiar et al.] // *Ann. Surg.* – 2011. – Vol. 214. – P. 621-626.
26. Rubanyi G.M. The role of endothelium in cardiovascular homeostasis and diseases / G.M. Rubanyi // *J. Cardiovasc. Pharmacol.* – 2013. – Vol. 22, Suppl. 4. – P. S1-S4.
27. Москалюк В.Д. ВІЛ-інфекція/СНІД / В.Д. Москалюк, С.Р. Меленко. – Чернівці: Видавництво Буковинського державного медичного університету, 2013. – 221 с.
28. Меленко С.Р. Ендотеліальна дисфункція та кріопаті у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД; автореф. дис. ... канд. мед. наук / С.Р. Меленко. – Ки в, 2011. – 22 с.
29. Mantovani A. Cytokine regulation of endothelial cell function / A. Mantovani, F. Bussolino, E. Dejana // *The FASEB J.* – 2012. – Vol. 6. – P. 2591-2599.
30. Hypoxia/reoxygenation stimulates endothelium to promote neutrophil adhesion / [O. Palluy, L. Morliere, J. C. Gris et al.] // *Free Radic. Biol. Med.* – 2012. – Vol. 13. – P. 21-30.
31. Дисциркуляторная энцефалопатия (тромбофилия, эндотелиальная дисфункция, демиелинизация) / Под ред. проф. В.И. Головкина. – СПб: РИФ «Роза мира», 2004. – 224 с.
32. Dohi Y. Age-related changes in vascular smooth muscle and endothelium / Y. Dohi, M. Kojima, T. F. Luscher // *Drugs Aging.* – 2005. – Vol. 7, N 4. – P. 278-291.
33. Halcox J. Endothelial dysfunction and prognosis / J. Halcox // *Circulation.* – 2012. – Vol. 106. – P. 653-959.
34. Ильянкова А.А. Клинико-морфологическая характеристика внепеченочных проявлений HBV-инфекции / А.А. Ильянкова, П.Е. Крель // *Рос. журн. гастроэнт., гепатол., колопроктол.* – 2001. – № 3. – С. 11-18.
35. Кудряшева О.В. Эндотелиальный гемостаз: система тромбомодулина и её роль в развитии атеросклероза и его осложнений / О.В. Кудряшева, Д.А. Затеищikov, Б.А. Сидоренко // *Кардиология.* – 2000. – Т. 40, № 8. – С. 65-70.
36. Chiba T. Multivariate analysis of risk factors for autoimmune diseases patients with human immunodeficiency virus / T. Chiba, Y. Matsuzaki, M. Abei // *Human Immunol.* – 2006. – Vol. 71. – P. 552-558.
37. Blann A.D. Endothelial cell activation, injury, damage and dysfunction: separate entities or mutual terms? / A.D. Blann // *Blood Coagul. Fibrinolysis.* – 2000. – Vol. 11, N 7. – P. 623-630.
38. Frangeul L. Human immunodeficiency virus in patients with AIDS, with and without cryoglobulinemia / L. Frangeul, L. Musset, P. Cresta // *Clin. Exp. Immunol.* – 2006. – Vol. 25, N 10. – P. 427-432.
39. Expression of a new family of receptors similar to CXC chemokine receptors in endothelial cell precursors / [E. Devic, K. Rizzoti, S. Bodin et al.] // *Pathol. Biol. (Paris).* – 2009. – Vol. 47, N 4. – P. 330-338.
40. Weiler H. Thrombomodulin / H. Weiler, B.H. Isermann // *Thromb. Haemost.* – 2003. – Vol. 1, N 7. – P. 1515-1524.
41. Plasma from patients with idiopathic and human immunodeficiency virus-associated thrombotic thrombocytopenic purpura induces apoptosis in microvascular endothelial cells / [J. Laurence, D. Mitra, M. Steiner et al.] // *J. Pathol.* – 2009. – Vol. 188, N 1. – P. 76-81.

### ENDOTHELIUM: FUNCTIONAL PROPERTIES AND ITS DYSFUNCTION

Kh.I. Vozna, V.D. Moskaliuk

*SUMMARY.* The study deals with current information about the physiology of endothelium and pathogenesis of endothelial dysfunction. Particular attention is paid to the influence of many interconnected vasoactive substances of endothelial origin, especially nitric oxide (NO) and endothelin. Despite the generally accepted value of endothelial dysfunction in cardiovascular and cerebral diseases, much attention is paid to the role of this phenomenon in some somatic and infectious diseases, particularly in HIV-infection/AIDS.

**Key words:** endothelium, endothelial dysfunction, cardiovascular pathology, HIV-infection/AIDS.

Отримано 28.05.2014 р.