

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ТЕРАПЕВТІВ БУКОВИНИ»**



Науково-практична конференція з міжнародною участю

**«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОМОРБІДНОСТІ У
КЛІНІЦІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ»**

**присвячена 100-річчю від Дня народження
професора Самсон Олени Іларіонівни**

15-16 квітня 2021 року

м. Чернівці

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАКУ СТРАВОХОДУ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Щербиніна М.Б., Соловійова Н.Є.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,

м. Дніпро, scherbinina@ua.fm

Актуальність проблеми. Рак стравоходу (РС) є шостою за значимістю причиною онкологічної смертності в світі через агресивний перебіг, неефективний скринінг та діагностику, зазвичай, на пізній стадії захворювання.

Мета роботи – проаналізувати захворюваність та смертність на РС серед населення України та Дніпропетровської області шляхом вивчення офіційних показників за період 2014-2019 рр.

Матеріали та методи. Опрацьовані стандартизовані показники захворюваності та смертності від РС по Україні загалом та Дніпропетровської області на 100 тис. дорослого населення зокрема. Дослідження здійснювалося за матеріалами Національного канцер-реєстру України. Статистичну обробку отриманих даних проведено із застосуванням загальноприйнятих статистичних методів.

Результати та їх обговорення. Загальноукраїнський показник захворюваності на РС за період 2014-2019 рр. в середньому становив 4,5 на 100 тис. населення. Захворюваність на РС в Дніпропетровській області у 2019 році залишилась на рівні 2014 року і становила 4,1 на 100 тис. населення, тоді як по Україні цей показник знизився на 6,5%. При цьому протягом 2014-2017 рр. кількість зареєстрованих випадків у Дніпропетровському регіоні була на 11- 14% меншою за цей показник по Україні загалом.

Динамічний аналіз показав, що у 2015 та 2019 роках мало місце зменшення захворюваності як у Дніпропетровській області (відповідно, на 12,2 та 16,3% порівняно з попередніми роками), так і загалом в Україні (на 8,7 та 12,2%, відповідно). Натомість у 2018 році спостерігалось значне підвищення у Дніпропетровському регіоні кількості випадків виявлення РС на 25,6% порівняно з 2017 роком, тоді як по Україні в цей період констатується факт збільшення захворюваності на 11,2%

Показник смертності від РС за період 2014-2019 рр. мав незначні коливання від 3,3 до 3,6 на 100 тис. населення, проте загалом за шість років знизився на 8,3%. У Дніпропетровській області в 2015 та 2019 роках спостерігалось зниження смертності на 25,0% та 13,9% порівняно з попередніми роками: у 2015 році цей показник

становив 2,7 проти 3,6 на 100 тис. населення – у 2014 році і 3,1 на 100 тис. населення у 2019 році проти 3,6 на 100 тис. населення – у 2018 році. У 2018 році, навпаки, мало місце підвищення цього показника на 28,6%, складаючи 3,6 на 100 тис. населення проти 2,8 на 100 тис. населення у 2017 році. До того ж у 2015-2017 рр. смертність у Дніпропетровському регіоні на 20-23% була нижчою порівняно з показником по Україні.

2018 року 88% випадків РС діагностовано у чоловіків і лише 12% – у жінок. Переважна більшість хворих на РС зафіксовано у віці 50-80 років. Смертність від РС значно вища у чоловіків (91,2%) порівняно з жінками.

Висновки. Серед населення Дніпропетровської області за період 2014- 2019 рр. має місце певна стабільність рівня показників захворюваності та смертності РС щодо населення України загалом, проте існує необхідність підвищення уваги при здійсненні лікувально-профілактичної допомоги цій категорії онкологічних пацієнтів.