


ISSN 1681 - 2557

**МЕДИЧНА
ХІМІЯ**
Medical Chemistry



2(51) ТОМ 14
2012

- ❖ Молекулярні механізми розвитку патології
- ❖ Біохімія у діагностиці та лікуванні
- ❖ Біохімія серцево-судинних хвороб
- ❖ Біохімічна гепатологія та нефрологія
- ❖ Біохімія ендокринних хвороб
- ❖ Патохімія спадкових хвороб
- ❖ Патохімія екстремальних станів
- ❖ Біохімія в хірургічній клініці
- ❖ Нейрохімія та патохімія головного мозку
- ❖ Імунохімія
- ❖ Біохімія радіаційних уражень
- ❖ Біохімічні аспекти моделювання патологічних процесів
- ❖ Ксенобіохімія
- ❖ Методи біохімічних досліджень
- ❖ Історія біохімії
- ❖ Проблеми і досвід викладання біологічної та медичної хімії
- ❖ Інформація, хроніка, ювілеї

- ❖ *Molecular Mechanisms of Pathology Development*
- ❖ *Biochemistry in Diagnostics and Treatment*
- ❖ *Biochemistry of Cardiovascular Diseases*
- ❖ *Biochemical Hepatology and Nephrology*
- ❖ *Biochemistry of Endocrinopathy*
- ❖ *Pathochemistry of Hereditary Diseases*
- ❖ *Pathochemistry of Extremal States*
- ❖ *Biochemistry in Surgical Clinics*
- ❖ *Neurochemistry and Pathochemistry of Cerebrum*
- ❖ *Immunochemistry*
- ❖ *Biochemistry of Radiation Injuries*
- ❖ *Biochemical Aspects of Simulation of Pathologic Processes*
- ❖ *Xenobiochemistry*
- ❖ *Methods of Biochemical Investigations*
- ❖ *History of Biochemistry*
- ❖ *Problems and Experience of Biological and Medical Chemistry Teaching*
- ❖ *Information, Chronicle, Jubilees*

МЕДИЧНА ХІМІЯ

Науковий журнал

MEDICAL CHEMISTRY

Scientific Journal

ISSN 1681-2557

Виходить щоквартально
Published 4 times per year

Заснований у грудні 1999 року
Founded in December 1999

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія KB № 3647 від 26.01.1999 р.
Certificate of state registration:
series KB № 3647 from 26.01.1999

Передплатний індекс: 22869
Subscription index: 22869

Відповідно до постанови Президії ВАК України № 1-05/3 від 14.04.2010 р. журнал "Медична хімія" внесений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних і біологічних наук.

Журнал "Медична хімія" акредитований науково-видавничою радою Президії АМН України (лист № 02-17/1341 від 25.10.2001 р.).

Рекомендовано до видання вченюю радою ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України" (протокол № 11 від 24 квітня 2012 р.).

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

Журнал "Медична хімія"
Видавництво "Укрмедкнига"
Майдан Волі, 1
46001, м. Тернопіль
УКРАЇНА

EDITORIAL OFFICE ADDRESS:

Journal "Medical Chemistry"
Publishing House "Ukrmedknyga"
Maidan Voli, 1
46001, Ternopil
UKRAINE

Tel.: (0352) 43-49-56
(0352) 52-80-09
Fax: (0352) 52-41-83
<http://www.tdmu.edu.te.ua>

За зміст рекламних матеріалів відповідальність несе рекламодавець.
При передрукі або відтворенні повністю чи частково матеріалів журналу "Медична хімія" посилання на журнал обов'язкове.

© Науковий журнал "Медична хімія", 2012
© Scientific Journal "Medical Chemistry", 2012

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Федорчук О. Г. (Київ) ІМУНОГЕННІ ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОАНГІОГЕНІЧНОГО ВАРІАНТА КАРЦИНОМІ ЛЕГЕНІ ЛЬЮСІ: ЗВ'ЯЗОК З МЕТАСТАТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Максимович Я. С., Дранцина А. С., Сокур О. В.,
Остапченко Л. І. (Київ) ЕКСПРЕСІЯ ІЗОФОРМ
СИНТАЗИ ОКСИДУ АЗОТУ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ
ТА ЗАГОЄННЯ СТРЕСІНДУКОВАНИХ УРАЖЕНЬ
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЩУРІВ

Воронкова Ю. С., Скорик О. Д., Штеменка Н. І.
(Дніпропетровськ) ХАРАКТЕРИСТИКА АНЕМІЧНОГО
ТА ГІПОГЛІКЕМІЧНОГО СТАНУ КРОВІ ПРИ
РОЗВИТКУ КАРЦИНОМІ ГЕРЕНА ТА
ЗАСТОСУВАННІ ЦІСПЛАТИНУ І КЛАСТЕРНИХ
СПОЛУК РЕНІЮ ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ
ВВЕДЕННЯ

Плясковська О. М. (Київ) АНТИАНГІОГЕННА ДІЯ
ЦИКЛОФОСФАНУ ВІДНОСНО МЕТАСТАЗУЮЧИХ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ПУХЛИН

Поляков В. В., Сенаторова Г. С. (Харків)
ОСОБЛИВОСТІ ОБМІNU СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
В ДІТЕЙ ІЗ БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ ТА
РЕЦІДИВНИМ ОБСТРУКТИВНИМ БРОНХІТОМ

Голік М. Ю., Українець І. В., Кравченко В. М.,
Петрушова Л. О. (Харків) СИНТЕЗ ТА ДІУРЕТИЧНА ДІЯ
АЛКІЛАМІДІВ 4-ПДРОКСІ-2-ОКСО-1,2,5,6,7,8-
ГЕКСАГДРОХІНОЛІН-3-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ

Шлюсар О. І., Блажеєвський М. Є., Александрова Д. І.
(Чернівці, Харків, Одеса) КІЛЬКІСНЕ ВІЗНАЧЕННЯ
ТРИФЛЮОПЕРАЗИNU В ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТАХ
МЕТОДОМ СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРІЇ У ВИГЛЯДІ
S-ОКСИДУ

Сусля О. Б. (Тернопіль) ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ
МІНЕРАЛЬНОГО МЕТАБОЛІЗМУ У ХВОРИХ
ІЗ КАЛЬЦІНОЗОМ КЛАПАНІВ СЕРЦЯ НА
ДОДІАЛІЗНОМУ ТА ДІАЛІЗНОМУ ЕТАПАХ
ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НІРОК

Олещук О. М. (Тернопіль) ПРООКСИДАНТНО-
АНТООКСИДАНТНИЙ БАЛАНС У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ
ПРИ ЇЇ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ ЗА ПРИСУТНОСТЬІ
МОДУЛЯТОРІВ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ

Яковлєва Л. В., Немятых О. Д., Кошова О. Ю. (Харків,
Луганськ) ДОСЛІДЖЕННЯ ІМУНОТРОПНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЕПАРАТУ ЕХІНАЦЕЇ
ПУРПУРОВОЇ У ФОРМІ ЖЕЛЕ

Філіпчова К. А., Вовчук І. Л. (Одеса) ФІЗИКО-ХІМІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ КАРБОКСИПЕПТИДАЗИ А
ЗЛОЯКІСНОГО НОВОУТВОРЕННЯ МОЛОЧНОЇ
ЗАЛОЗИ

Щерба В. В., Корда М. М. (Тернопіль) ПАТОГЕНЕТИЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІGU ПАРОДОНТИТУ
НА ФОНІ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ

Іскра Р. Я. (Львів) БІЛКОВИЙ ОБМІN У ВАГІТНИХ
ЩУРІВ ЗА ДІЇ ЦІТРАТУ НАНОХРОМУ

Contents

ORIGINAL INVESTIGATIONS

Fedorchuk O. H. (Kyiv) IMMUNOGENIC PROPERTIES
OF HIGH-ANGIOGENIC LEWIS LUNG CARCINOMA:
CORELATION WITH METASTATIC POTENTIAL

5

Maksymovych Ya. S., Dranytsyna A. S., Sokur O. V.,
Ostapchenko L. I. (Kyiv) EXPRESSION OF NITRIC OXIDE
SYNTHASE ISOFORMS UNDER DEVELOPMENT AND
HEALING OF STRESS-INDUCED INJURIES OF RAT
11 GASTRIC MUCOSA

Voronkova Yu. S., Skoryk O. D., Shtemenko N. I.
(Dnipropetrovsk) CHARACTERISTICS OF THE ANAEMIC
AND HYPOGLYCEMIA STATE OF BLOOD AT THE
GUERIN'S CARCINOMA GROWTH AND APPLICATION
OF CISPLATINUM AND RHENIUM CLUSTER
COMPOUNDS AT DIFFERENT FORMS OF
18 INTRODUCTION

Pyaskovska O. M. (Kyiv) ANTIANGIOGENIC ACTION
OF CYCLOPHOSPHAMIDE TO EXPERIMENTAL
25 METASTATIC TUMORS

Polyakov V. V., Senatorova H. S. (Kharkiv) THE
FEATURES OF CONNECTIVE TISSUE METABOLISM
IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AND
30 RECIDIVATING OBSTRUCTIVE BRONCHITIS

Holik M. Yu., Ukrainets I. V., Kravchenko V. M.,
Petrushova L. O. (Kharkiv) SYNTHESIS AND DIURETIC
ACTION OF 4-HYDROXY-2-OXO-1,2,5,6,7,8-
35 HEXAHYDROQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID
ALKYLAMIDES

Shliusar O. I., Blazheyevskyi M. Ye., Aleksandrova D. I.
(Chernivtsi, Kharkiv, Odessa) QUANTITATIVE
DETERMINATION OF TRIFLUOPERAZINE BY
SPECTROFLUORIMETRIC METHOD AS ITS
39 SULPHOXIDE IN DRUG

Susla O. B. (Ternopil) CHARACTERISTICS OF MINERAL
METABOLISM DISTURBANCES IN PATIENTS WITH
CARDIAC VALVE CALCINOSIS UNDER PREDIALYSIS
AND DIALYSIS STAGES OF CHRONIC KIDNEY
44 DISEASE

Oleshchuk O. M. (Ternopil) PROOXIDANT-ANTIOXIDANT
BALANCE AT ISCHEMIC-REPERFUSION
OF LIVER OF RATS AT THE PRESENCE OF NITRIC
49 OXIDE SYNTHESIS MODULATORS

Yakovleva L. V., Nemyatykh O. D., Kosheva O. Yu.
(Kharkiv, Luhansk) RESEARCH OF IMMUNOTROPIC
PROPERTIES OF ECHINACEA PURPUREA DRUG
54 IN JELLY FORM

Filipchova K. A., Vovchuk I. L. (Odessa) PHYSICOCHEMICAL
PROPERTIES OF CARBOXYPEPTIDASE A OF THE
MALIGNANT TUMOR TISSUE OF THE MAMMALIAN
59 GLAND

Shcherba V. V., Korda M. M. (Ternopil) PATHOGENETIC
PECULIARITIES OF PERIODONTITIS IN CHRONIC
64 HEPATITIS

Iskra R. Ya. (Lviv) PROTEIN METABOLISM IN PREGNANT
RATS UNDER THE ACTION OF CITRATE
69 NANOCROMIUM

О. І. Шлюсар¹, М. Є. Блажеєвський, Д. І. Александрова²
 БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЧЕРНІВЦІ
 НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ХАРКІВ
 ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ О. В. БОГАТСЬКОГО НАН УКРАЇНИ², ОДЕСА

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИФЛЮОПЕРАЗИNU В ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТАХ МЕТОДОМ СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРІЇ У ВИГЛЯДІ S-ОКСИДУ

Описано високочутливий спектрофлуориметричний метод кількісного визначення трифлюоперазину гідрохлориду у вигляді його сульфоксиду, одержаного за допомогою пероксомоносульфату. Положення максимумів збудження ($\lambda_{\text{зб}}$) та емісії ($\lambda_{\text{ем}}$) знаходилися при $\lambda_{\text{зб}}=274 \text{ нм}/\lambda_{\text{ем}}=407 \text{ нм}$ відповідно. Запропонований метод успішно випробуваний під час визначення трифлюоперазину гідрохлориду в лігурках та розчині для ін'єкцій; результати аналізу узгоджуються з результатами, одержаними при виконанні аналізу за допомогою офіцинальних методик ($(98,40 \pm 3,60)$ та $(99,50 \pm 2,45) \%$ відповідно).

КЛЮЧОВІ СЛОВА: спектрофлуориметрія, трифлюоперазину гідрохлорид, S-окиснення, калію гідрогенпероксомоносульфат.

ВСТУП. Ліперазинове N₁₀-алкілзаміщене похідне фенотіазину – трифлюоперазину гідрохлорид (2-трифлюорметил-10-[3-метилпіперазиніл-4]-пропіл)-фенотіазину дигідрохлорид, трифторметил-10-[3-метилпіперазиніл-4]-пропіл)-фенотіазину гідрохлорид (ТФ) – належить до нейролептичних засобів. За інтенсивністю антипсихотичної дії він переважає аміназин. Проявляє сильну протиблювотну дію, альфа-адреноблокуючу активність, чинить виражену екстрапіраміdalну дію. Застосовують, головним чином, для лікування шизофренії, психозів та інших патологічних станів [1].

Найбільш важливою властивістю препаратів цієї групи є надзвичайно легка здатність окиснюватися з утворенням відповідних S-оксидів [15]. Висока біологічна активність похідних фенотіазину, а також їх лабільність вимагають розробки чутливих, швидких у виконанні й достатньо вибіркових методик кількісного визначення їх у лікарських препаратах та біологічних об'єктах, наприклад високочутливим методом флуориметрії [14]. Однак наявні в літературі відомості стосовно флуоресцентних властивостей даної групи лікарських засобів вельми обмежені, а іноді суперечливі. Так, згідно з [18], фенотіазини володіють слабкою власною флуоресценцією, і для проведення аналізу вимагається, щоб препарат був попередньо окиснений. Разом із тим, деякі ав-

тори вважають флуориметрію одним з найбільш чутливих і точних фізико-хімічних методів аналізу фенотіазинів, особливо за присутності продуктів окиснення. Крім того, відомо [17], що на флуоресценцію (ФЛ) похідних фенотіазину впливає природа розчинника.

Основним нормативним методом кількісного визначення вмісту основної речовини у субстанції є кислотно-основне титрування у неводному середовищі [2]. Відомі також інші способи кількісного визначення: алкаліметрія за залишком зв'язаної хлоридної кислоти [3, 4], екстракційна фотометрія (за взаємодією препаратів як слабких основ з кислотними індикаторами) [5], а також інші фізико-хімічні методи, такі, як: потенціометрія [6], спектрофотометрія [7, 8] і вольтамперометрія продуктів їх окиснення [9, 10], ВЕРХ [2, 11, 12, 19], метод кінетики [13, 16].

Кількісне визначення ТФ у лігурках та розчині для ін'єкцій рекомендують здійснювати методом прямої спектрофотометрії за власним світлопоглинанням препарату [2, 3].

Метою даної роботи було порівняльне вивчення флуоресценції трифлюоперазину дигідрохлориду та відповідного S-оксиду ТФ (ТФО), отриманого за допомогою калію гідрогенпероксомоносульфату, а також з'ясування можливості кількісного визначення ТФ у вигляді попередньо одержаного ТФО за оптимальних умов.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Як об'єкти дослідження використовували трифлюоперазину дигідрохлорид фармакопейної чистоти і його лікарські форми: пігульки трифтазину по 0,005 г, покриті оболонкою (ФФ "Здоров'я", Харків, Україна), серія 280899; розчин трифтазину 0,2 % для ін'єкцій (ФФ "Дарниця", Київ, Україна), серія 210900.

Розчини ТФО готували за точними наважками субстанції ТФО, отриманої за автентичною методикою проф. М. Є. Блажеєвського [20], об'ємно-вагозим методом у спектрально чистих розчинниках – метанолі, 95 % етанолі та двічі дистильованій воді. Усі розчини зберігали при температурі 18–20 °С у темному місці.

Як окисник використовували потрійну калійну сіль кислоти Каро ($2\text{KHSO}_5 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{KHSO}_4$) – "Оксон" виробництва фірми "DuPont", "extra rige". Активнодіюча її речовиною є калію гідрогенпероксомоносульфат (KHSO_5). Вибір реагента зумовлений його доступністю, задовільною розчинністю у воді, порівняно високою окисдаційною здатністю ($E^{\circ}=1,81$ В), а також достатньою стійкістю під час зберігання та застосування.

Приготування $2 \cdot 10^{-2}$ моль/л розчину калію гідрогенпероксомоносульфату. Наважку порошку Оксону®, яка містить 0,615 г основної речовини, кількісно переносять у колбу на 100 мл, розчиняють у 70 мл дистильованої води при перемішуванні й доводять об'єм двічі дистильованою водою до позначки.

Спектри збудження та люмінесценції реєстрували при 20 °С на спектрофлуориметрі Cary Eclipse (Varian) із ксеноновою жарівкою 150 W. Усі спектри коректували за стандартним зразком родаміну В. Калібрування та запис спектрів ФЛ ТФО здійснювали не менше 3–5 разів, усереднювали і віднімали усереднений спектр розчинників. УФ/ВІД спектри світлопоглинання реєстрували за допомогою спектрофотометра UV 2401 PC фірми "Shimadzu". Умови: щілина:5-5; $\lambda_{\text{ex}}=274$ нм; підсилення 660.

Вивчали люмінесцентні властивості ТФО в метанолі, етанолі та воді.

РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Встановлено, що у порівняльних умовах ФЛ S-оксиду ТФ значно сильніша, ніж така ТФ. Найвища інтенсивність ФЛ для обох досліджуваних похідних спостерігалась у водному розчині.

На підставі одержаних результатів розроблено прості та чутливі методики спектрофлуориметричного визначення лікарської речовини трифлюоперазину дигідрохлориду у вигляді відповідного S-оксиду в пігульках по

5 мг та розчині для ін'єкцій. Методики основані на утворенні інтенсивно флуоресцюючого ТФО – продукту S-окиснення ТФ калію гідрогенпероксомоносульфатом. Схему окиснення трифлюоперазину калію гідрогенпероксомоносульфатом наведено на рисунку 1.




Рис. 1. Схема окиснення трифлюоперазину дигідрохлориду калію гідрогенпероксомоносульфатом.

До водного розчину проби аналіту додавали розчин Оксону® і витримували декілька хвилин. Після відповідного розбавлення вимірювали інтенсивність ФЛ одержаного розчину. На рисунку 2 наведено спектри люмінесценції ТФО, одержаного за посередництва калію гідрогенпероксомоносульфату у водних розчинах. Оптимізовано положення максимумів збудження (λ_{ex}) та емісії (λ_{em}), які знаходилися при $\lambda_{\text{ex}}=274$ нм/ $\lambda_{\text{em}}=407$ нм. Градуювальний графік для кількісного визначення ТФ у вигляді ТФО представлено на рисунку 3. Як видно, лінійність зберігалась в інтервалі від 0,05 до 4,0 мкг/мл ($I_{\text{фл}}=192,31c+2,8$, $r=0,999$).

Розчин РСЗ 2,0 мг/мл трифлюоперазину дигідрохлориду. В мірній колбі на 100 мл розчиняють наважку порошку субстанції трифлюоперазину дигідрохлориду, яка містить 200,0 мг основної речовини, у 170 мл двічі дистильованої води, доводять об'єм до позначки і ретельно перемішують.

Методика визначення вмісту трифлюоперазину дигідрохлориду в 0,2 % розчині для ін'єкцій. 1,00 мл 0,2 % розчину трифлюоперазину для ін'єкцій вміщують у мірну колбу




Рис. 2. Спектри люмінесценції ТФО у водних розчинах. $\lambda_{\text{ex}}=274$ нм.




Рис. 3. Градуальний графік для кількісного визначення ТФ у вигляді ТФО.

на 100 мл, додають 0,2 мл $2 \cdot 10^{-2}$ моль/л розчину калію гідрогенпероксомоносульфату, доводять об'єм двічі дистильованою водою до позначки і ретельно перемішують. За допомогою піпетки відбирають 10 мл одержаного розчину, переносять у мірну колбу на 1000 мл, доводять об'єм до позначки двічі дистильованою водою і ретельно перемішують. Інтенсивність ФЛ отриманого розчину вимірюють при $\lambda_{\text{зб}}=274$ нм/ $\lambda_{\text{ем}}=407$ нм. Паралельно за аналогічних умов аналізують розчин РСЗ трифлюоперазину.

Масову частку трифлюоперазину дигідрохлориду (W) у розчині для ін'єкцій, у відсотках, розраховують за формулою:

$$W = \frac{0,2000 \cdot I_1 \cdot 100 \cdot 100}{I_0 \cdot 100 \cdot 100},$$

де I_1 – інтенсивність люмінесценції в досліді з досліджуваним розчином, відн. од.;

I_0 – інтенсивність люмінесценції в досліді з розчином робочого стандартного зразка (РСЗ);

0,2000 – вміст трифлюоперазину дигідрохлориду в 100 мл розчину робочого стандартного зразка (РСЗ), г;

100, 100 – кратність розбавлення.

Розчин РСЗ 0,050 мг/мл трифлюоперазину дигідрохлориду. В мірній колбі на 1000 мл розчиняють наважку порошку субстанції трифлюоперазину дигідрохлориду, яка містить 50,0 мг основної речовини, у 100 мл двічі дистильованої води, доводять об'єм до позначки і ретельно перемішують.

Методика визначення вмісту трифлюоперазину дигідрохлориду в пігулях по

5 мг. Точну наважку близько 0,2 г порошку розтертих пігулок трифлюоперазину, що відповідає масі однієї пігулки, змішують із 20 мл 0,1 моль/л розчину хлоридної кислоти, збовтують протягом 20 хв, фільтрують через фільтр "червона стрічка", залишок на фільтрі ретельно ополіскують тричі порціями по 20 мл двічі дистильованою водою. Об'єднавши фільтрати, кількісно переносять розчин у мірну колбу на 100 мл, додають 1,0 мл $2 \cdot 10^{-2}$ моль/л розчину калію гідрогенпероксомоносульфату, розчин ретельно збовтують впродовж 2 хв, доводять об'єм двічі дистильованою водою до позначки і знову ретельно перемішують. За допомогою піпетки відбирають 10 мл одержаного розчину, переносять у мірну колбу на 1000 мл, доводять об'єм до позначки двічі дистильованою водою і ретельно перемішують. Інтенсивність ФЛ одержаного розчину вимірюють при $\lambda_{\text{зб}}=274$ нм/ $\lambda_{\text{ем}}=407$ нм. Паралельно за аналогічних умов аналізують розчин РСЗ трифлюоперазину.

Вміст препарату (X) у пігулці, в міліграмах, розраховують за формулою:

$$X = \frac{m_{\text{РСЗ}} \cdot I_X \cdot \bar{a} \cdot 100}{I_0 \cdot m},$$

де I_X – інтенсивність люмінесценції у досліді з досліджуваним розчином пігулок, відн. од.;

I_0 – інтенсивність люмінесценції в досліді з розчином робочого стандартного зразка (РСЗ);

$m_{\text{РСЗ}}$ – вміст препарату в розчині РСЗ, мг/мл;

m – наважка порошку розтертих пігулок, взятих для аналізу, г;

\bar{a} – середня маса пігулки, г.

Одержані результати кількісного визначення трифлюоперазину дигідрохлориду у 0,2 % розчині для ін'єкцій та пігулях по 5 мг у вигляді S-оксиду ТФ методом спектрофлуориметрії показано в таблицях 1 і 2.

Як видно, під час здійснення визначення 0,2–0,5 мкг/мл трифлюоперазину дигідрохлориду за новоопрацьованими методиками методом спектрофлуориметрії $RSD \leq 3,0\%$.

ВИСНОВКИ. Опрацьовано методики та показано можливість кількісного визначення трифлюоперазину дигідрохлориду у 0,2 % розчині для ін'єкцій та пігулях по 5 мг методом спектрофлуориметрії у вигляді S-оксиду, одержаного за допомогою калію гідрогенпероксомоносульфату. При визначенні 0,2–0,5 мкг/мл трифлюоперазину дигідрохлориду $RSD \leq 3,0\%$.

Таблиця 1 – Результати кількісного визначення трифлюоперазину в розчині для ін'єкцій у вигляді S-оксиду методом спектрофлуориметрії ($P=0,95$)

Досліджуваний розчин складу	Взято		Знайдено		Метрологічні характеристики
	розчину	визначуваної речовини	г	%	
	мл	г	г	%	
"Трифтазин" (ФФ "Дарниця", Київ, Україна), серія 210900 Трифлюоперазину дигідрохлориду* 0,002 г, допоміжних речовин – достатня кількість для одержання 1 мл розчину	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,00197** 0,00197 0,00197 0,00197 0,00197	0,00201 0,00197 0,00202 0,00204 0,00194	100,5 100,0 101,0 102,0 97,0	$\bar{X}=0,00199$ (99,50 %) $S=0,39 \cdot 10^{-4}$ $S_{\bar{X}}=0,18 \cdot 10^{-4}$ $\Delta \bar{x}=0,49 \cdot 10^{-4}$ $RSD=1,96 \%$ $\varepsilon=\pm 2,46 \%$ $\delta=+1,96$

Примітка. * – визначувана речовина; ** – точний вміст трифлюоперазину дигідрохлориду вказано у сертифікаті якості.

Таблиця 2 – Результати кількісного визначення трифлюоперазину дигідрохлориду в пігульках у вигляді S-оксиду методом спектрофлуориметрії ($P=0,95$)

Взято трифлюоперазину дигідрохлориду, мг	Знайдено		Метрологічні характеристики
	мг	%**	
"Трифтазин" – пігулки по 0,005 г, покриті оболонкою ФФ "Здоров'я", Харків, Україна, серія 280899			
4,8*	5,1 4,9 5,0 4,9 4,7	102,0 98,0 100,0 98,0 94,0	$\bar{X}=4,92$ (98,40 %) $S=\pm 0,15$ $S_{\bar{X}}=\pm 0,07$ $\Delta \bar{x}=\pm 0,18$ $RSD=3,01$ $\varepsilon=\pm 3,66 \%$ $\delta=+2,50\%$

Примітка. * – вміст установлено за фармакопейною методикою [3]; ** – за 100 % взято регламентований вміст трифлюоперазину в препараті (в розрахунку на одну пігулку).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Байерман К. Определение следовых количеств органических веществ / К. Байерман ; пер. с англ. – М. : Мир, 1987. – 429 с.
- Блажеєвський М. Є. Мікротитриметричне визначення похідних фенотіазину в лікарських формах з використанням пероксикислотного окиснення / М. Є. Блажеєвський // Фармац. журн. – 2001. – № 6. – С. 55–65.
- Блажеєвський М. Є. Непрямое полярографічне визначення похідних фенотіазину у вигляді S-оксидів, одержаних за посередництвом пероксикарбонових кислот / М. Є. Блажеєвський // Журн. орган. та фармац. хімії. – 2005. – 3, вип. 2(10). – С. 61–65.
- Блажеєвський М. Є. Синтез, властивості та застосування S-оксидів похідних фенотіазину як вагінальних контрацептивів / М. Є. Блажеєвський // Сучасні технології органічного синтезу та медичної хімії : тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 4 квіт. 2003 р. – Х., 2003. – С. 21.
- Блажеєвський М. Є. Спектрофотометричне визначення 10-алкілпохідних фенотіазину в лікарських формах з використанням пероксикислотного окиснення / М. Є. Блажеєвський // Фармац. журн. – 2003. – № 1. – С. 64–73.
- Гайдук О. В. Новая каталитическая реакция для определения производных фенотиазина /
- О. В. Гайдук, Р. П. Панталер, А. Б. Бланк // Журн. аналіт. хімії. – 2004. – 59, № 7. – С. 768–772.
- Державна Фармакопея України / Державне підприємство "Науково-експертний фармакопейний центр". – 1-ше вид. – Харків : РІРЕГ, 2001. – Доповнення I. – 2004. – 520 с.
- Малахова С. В. Количественное определение нонахлазина флюориметрическим методом / С. В. Малахова, П. Л. Сенов // Фармация. – 1976. – 25, № 6. – С. 34–37.
- Машковский М. Д. Лекарственные средства : пособие для врачей / М. Д. Машковский. – 15-е изд., перераб., испр. и доп. – М. : Новая волна, 2005. – 1200 с.
- Панкратов А. Н. Спектрофотометрическое, вольтамперометрическое и квантово-химическое исследование реакции окисления фенотиазина / А. Н. Панкратов, И. М. Учаева, А. Н. Степанов // Журн. общей химии. – 1994. – 64, вып. 9. – С. 1527–1533.
- Туркевич М. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби) : підручник / М. Туркевич, О. Владзімірська, Р. Лесик. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2003. – 464 с.
- Хвещук П. Ф. Изучение флуоресцентных свойств производных фенотиазина / П. Ф. Хвещук,

- A. B. Рудакова // Журн. прикл. химии. – 1994. – **67**, № 10. – С. 1675–1678.
13. Basavaiah K. Use of extractive spectrophotometry and ion-pair formation with chromeazurol S for the assay of some phenothiazine antipsychotic drugs in pharmaceutical formulations / K. Basavaiah, J. Manjunatha Swamy, G. Krishnamurthy // Chem. Anal. – 1999. – **44**, № 6. – P. 1049–1054.
14. Derivative spectrophotometric, thin layer chromatographic-densitometric and high performance liquid chromatographic determination of trifluoperazine hydrochloride in presence of its hydrogen peroxide induced-degradation product / A. El-Gindy, B. El-Zeany, T. Awad, M. M. Shabana // J. Pharm. Biomed. Anal. – 2002. – **27**, № 1–2. – P. 9–18.
15. Diehl G. Post-column oxidative derivatization for the liquid chromatographic determination of phenothiazines / G. Diehl, U. Karst // Chromatogr A. – 2000. – **890**, № 2. – P. 281–287.
16. Differential-Pulse Polarographic Determination of Some N-Substituted Phenothiazine Derivatives in Dosage Forms and Urine Through Treatment with Nitrous Acid / F. Belal, S. M. El-Ashry, I. M. Shehata [et al.] // Microchimica Acta. – 2000. – **135**, № 3–4. – P. 147–154.
17. Efficient oxidizing agents for determination of 2,10-disubstituted phenothiazines / H. Puzanowska-Tarasiewicz, L. Kuznička, J. Karpinska, K. Mielech-Lukasiewicz // Anal Sci. – 2005. – **21**, № 10. – P. 1149–1153.
18. European pharmacopoeia. – 6th-ed. Council of Europe. – Strasbourg : EDQM, 2007. – 2199 p.
19. Gala B. Use of a stopped-flow/T-format spectrofluorimeter for simultaneous kinetic / B. Gala, A. Gomez-Hens, D. Perez-Bendito // Anal. Chimica Acta. – 1995. – **310**, № 3. – P. 453–459.
20. Simple and simultaneous determination for 12 phenothiazines in human serum by reversed-phase high-performance liquid chromatography / Einosuke Tanaka, Takako Nakamura, Masaru Terada [et al.] // Journal of Chromatography B. – 2007. – **854**, № 1–2. – P. 116–120.

О. И. Шлюсар¹, Н. Е. Блажевский¹, Д. И. Александрова²
БУКОВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ЧЕРНОВЦЫ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ХАРЬКОВ
ФІЗИКО-ХІМІЧЕСКИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНИ О. В. БОГАТСКОГО НАН УКРАЇН², ОДЕССА

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРИФЛЮОПЕРАЗИНА В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ МЕТОДОМ СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРИИ В ВИДЕ S-ОКСИДА

Резюме

Описан высокочувствительный спектрофлуориметрический метод количественного определения трифлюоперазина гидрохлорида в виде его сульфоксида, полученного с помощью пероксомоносульфата. Положения максимумов возбуждения ($\lambda_{возб}$) и эмиссии ($\lambda_{эм}$) находились при $\lambda_{возб}=274$ нм/ $\lambda_{эм}=407$ нм соответственно. Предложенный метод с успехом апробирован во время определения трифлюоперазина гидрохлорида в таблетках и растворе для инъекций; результаты анализа согласуются с результатами, полученными при выполнении анализа с помощью официальных методик ($(98,40\pm3,60)$ и $(99,50\pm2,45)\%$ соответственно).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спектрофлуориметрия, трифлюоперазина гидрохлорид, S-окисление, калия гидрогенпероксомоносульфат.

O. I. Shliusar¹, M. Ye. Blazheyevskyi, D. I. Aleksandrova²
BUKOVYNIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY¹, CHERNIVTSI
NATIONAL PHARMACEUTICAL UNIVERSITY, KHARKIV
O. V. BOHATSKYI PHYSICAL AND CHEMICAL INSTITUTE OF NAS OF UKRAINE², ODESSA

QUANTITATIVE DETERMINATION OF TRIFLUOPERAZINE BY SPECTROFLUORIMETRIC METHOD AS ITS SULPHOXIDE IN DRUG

Summary

A highly sensitive spectrofluorimetric method is described for determination of trifluoperazine hydrochloride as its sulphoxide. The method involves the use of peroxomonosulphate as an oxidant. The produced fluorescence shows excitation and emission maxima around 274 and 407 nm, respectively. The calibration is linear for 0,05–3 mg of analyte. The proposed method was successfully applied to the determination of trifluoperazine hydrochloride in tablets and injection solution; the obtained results were in agreement with those given the official methods. The percentage recovery was $(98,40\pm3,60)$ and $(99,50\pm2,4)\%$ respectively.

KEY WORDS: spectrofluorimetry, trifluoperazine hydrochloride, S-oxidation, potassium hydrogenperoxomonosulphate, drug.

Отримано 10.10.11

Адреса для листування: О. І. Шлюсар, вул. Ентузіастів, 8, кв. 87, Чернівці, 58000, Україна.